



Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim · Tel. (06251) 1097-0 · Fax (06251) 3342  
www.reckeweg.de

## Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

*Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.*

*Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Dysmenorrhoe-Gastreu® S R 75 jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.*

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, suchen Sie bitte einen Arzt auf.

### Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Dysmenorrhoe-Gastreu® S R 75 und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Dysmenorrhoe-Gastreu® S R 75 beachten?
3. Wie ist Dysmenorrhoe-Gastreu® S R 75 anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Dysmenorrhoe-Gastreu® S R 75 aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

## Dysmenorrhoe-Gastreu® S R 75

Mischung zum Einnehmen

### 1. WAS IST DYSMENORRHOE-GASTREU® S R 75 UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Dysmenorrhoe-Gastreu® S R 75 ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane.

#### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: **Menstruationsbeschwerden.**

Hinweis: Bei Fieber, plötzlich einsetzenden starken Schmerzen im Unterbauch, sowie bei besonders starken oder anhaltenden Blutungen ist ein Arzt aufzusuchen.

### 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON DYSMENORRHOE-GASTREU® S R 75 BEACHTEN?

Bisher sind keine Gegenanzeigen bekannt.

#### Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Dysmenorrhoe-Gastreu® S R 75 ist erforderlich:

##### - bei Kindern:

Das Arzneimittel ist auf Grund des Anwendungsgebietes zur Anwendung bei Kindern nicht vorgesehen.

##### - in der Schwangerschaft:

Das Arzneimittel ist auf Grund des Anwendungsgebietes nicht für die Anwendung bei Schwangeren vorgesehen.

##### - in der Stillzeit:

Zur Anwendung des Arzneimittels in der Stillzeit liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor, es soll deshalb in der Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

#### Bei Anwendung von Dysmenorrhoe-Gastreu® S R 75 mit anderen Arzneimitteln:

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

**Bei Anwendung von Dysmenorrhoe-Gastreu® S R 75 zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:**  
Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### **Wichtige Warnhinweise über bestimmte sonstige Bestandteile von Dysmenorrhoe-Gastreu® S R 75:**

Dieses Arzneimittel enthält 26 mg Alkohol (Ethanol) pro 1 Tropfen (67 Vol.-%).

Die Menge in 5 Tropfen dieses Arzneimittels entspricht weniger als 4 ml Bier oder 2 ml Wein.

Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.

### **3. WIE IST DYSMENORRHOE-GASTREU® S R 75 ANZUWENDEN?**

Nehmen Sie Dysmenorrhoe-Gastreu® S R 75 immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen. Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1- bis 3-mal täglich je 5 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

#### **Dauer der Anwendung:**

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Bisher sind für Dysmenorrhoe-Gastreu® S R 75 keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de), anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **5. WIE IST DYSMENORRHOE-GASTREU® S R 75 AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis und dem Umkarton nach „verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

#### **Aufbewahrungsbedingungen:**

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

### **6. WEITERE INFORMATIONEN**

#### **Das Arzneimittel Dysmenorrhoe-Gastreu® S R 75 enthält:**

10 g (entsprechend 11,2 ml) enthalten: Wirkstoffe: Caulophyllum Dil. D2 2 g, Cimicifuga Dil. D3 2 g, Viburnum opulus Dil. D2 2 g, Magnesium phosphoricum Dil. D6 1 g. Die Wirkstoffe 1 bis 3 werden über die letzte Stufe gemeinsam potenziert. Sonstiger Bestandteil: Ethanol 62% (m/m).

1 ml entspricht 20 Tropfen.

#### **Darreichungsform und Packungsgrößen:**

Mischung zum Einnehmen in Flaschen mit 22 ml und 50 ml.

#### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim

Tel.: 06251/1097-0 · Fax: 06251/3342 · [www.reckeweg.de](http://www.reckeweg.de)

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2024.**

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr.: 6276618.00.00

Handpotenziert nach dem klassischen Mehrglasverfahren Hahnemanns.