

Gebrauchsinformation

DEQUONAL®

1,5 / 3,5 mg, Lösung

Für Erwachsene und Kinder

Liebe Patientin, lieber Patient!
 Bitte lesen Sie die gesamte
 Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn
 sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche
 Verschreibung erhältlich. Um einen
 bestmöglichen Behandlungserfolg zu
 erzielen, muss Dequonal jedoch
 vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf.
Vielleicht möchten Sie diese später
nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie
weitere Informationen oder einen Rat
benötigen.
- Wenn bei akuten Beschwerden nach
einigen Tagen keine Besserung eintritt,
müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:
 1. Was ist Dequonal und wofür wird es
angewendet?
 2. Was müssen Sie vor der Anwendung von
Dequonal beachten?
 3. Wie ist Dequonal anzuwenden?
 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
 5. Wie ist Dequonal aufzubewahren?
 6. Weitere Informationen

1. Was ist Dequonal und wofür wird es
angewendet?

Dequonal ist ein gebrauchsfertiges
 Arzneimittel zur Anwendung in der
 Mundhöhle auf Basis von Dequaliniumchlorid
 und Benzalkoniumchlorid.

Dequonal wird angewendet:
 • Zur unterstützenden zeitweiligen
Behandlung bei Entzündungen der
Mundschleimhaut.
 • Zur zeitweiligen Anwendung bei
Mundgeruch (soweit durch Keimbildung
in der Mundhöhle verursacht).

2. Was müssen Sie vor der Anwendung
von Dequonal beachten?

2.1 Dequonal darf nicht angewendet
werden bei

- bekannter Überempfindlichkeit gegen
Dequalinium-, Benzalkoniumchlorid oder
einen der anderen Bestandteile.
- bei Säuglingen und Kleinkindern unter
2 Jahren (Gefahr eines Kehlkopfkrampfes
durch Levomenthol).
- bei Patienten mit Bronchialasthma oder
anderen Atemwegserkrankungen, die mit
einer ausgeprägten Überempfindlichkeit
der Atemwege einhergehen. Die
Inhalation von Dequonal kann aufgrund
des Gehalts an Levomenthol zu Atemnot
führen oder einen Asthmaanfall auslösen.
- Nicht auf Wunden anwenden.

2.2 Besondere Vorsicht bei der
Anwendung von Dequonal ist
erforderlich

- Kinder: Zum Spülen oder Gurgeln sollte
Dequonal nur dann angewendet werden,
wenn der Patient die Gurgeltechnik
beherrscht. Daher ist die Anwendung
z. B. bei Säuglingen und Kleinkindern
nicht geeignet.
- Kontaktallergien: Patienten mit
allergischen Kontaktallergien sollten
die Wirkstoffe von Dequonal
(Dequaliniumchlorid und Benzalkonium-
chlorid) nicht anwenden, da eine
Sensibilisierung möglich ist.
- Augen: Vermeiden Sie Augenkontakt mit
dem Arzneimittel.

2.3 Anwendung von Dequonal mit
anderen Arzneimitteln oder anderen
Mitteln

Wechselwirkungen mit Arzneimitteln sind
keine bekannt.
 Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder
 Apotheker trotzdem, wenn Sie andere
 Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem
 eingenommen haben, auch wenn es sich um
 nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel
 handelt.
 Die Wirkstoffe von Dequonal werden durch
 Eiweiß, Serum und Eiter inaktiviert und in
 Gegenwart von üblichen Seifen, außerdem
 durch anionische, oberflächlich aktive
 Substanzen, Materialien wie poröse
 Stoffe (Gummi, Baumwolle, Kork) und
 Plastikmaterialien (Polyvinylchlorid,
 Polyäthylen), Phospholipide und andere
 lipidhaltige Substanzen abgeschwächt.

2.4 Schwangerschaft und Stillzeit

Es liegen keine ausreichenden Daten
 zur Sicherheit einer Anwendung bei
 Schwangeren vor.
 Wenn Sie schwanger sind, sollten Sie
 Dequonal nur anwenden, wenn Ihr
 behandelnder Arzt dies für unbedingt
 erforderlich hält.
 Es ist nicht bekannt, ob die Wirkstoffe von
 Dequonal in die Muttermilch übergehen.
 Deshalb sollte Dequonal nicht von stillenden
 Frauen angewendet werden, es sei denn,
 Ihr behandelnder Arzt hält dies für unbedingt
 erforderlich.

2.5 Verkehrstüchtigkeit und das
Bedienen von Maschinen

Für Dequonal sind keine negativen
 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit
 und das Bedienen von Maschinen bekannt.
 Es sind keine Vorsichtsmaßnahmen
 erforderlich.

2.6 Wichtige Informationen über
bestimmte sonstige Bestandteile
von Dequonal

Dequonal enthält 6 Vol.-% Alkohol.
 Alkoholranke könnten daher bei
 Anwendung von Dequonal einen Rückfall
 erleiden.
 Benzalkoniumchlorid und Macrogolglycerol-
 hydroxystearat können Hautreizungen
 hervorrufen.

3. Wie ist Dequonal anzuwenden?

Bitte halten Sie sich an die nachfolgenden
 Anwendungsvorschriften, da Dequonal sonst
 nicht richtig wirken kann.

Vorbereiten der Pumpe

Vor dem erstmaligen Gebrauch des Sprays
 und nach mehr als 3 Tagen Nichtgebrauch
 betätigen Sie die Pumpe 6mal, um
 vorhandene Luft zu entfernen.

Dosierungsanleitung

Dequonal, Gurgellösung
 Morgens und abends soll nach dem Essen
 mit je 5 ml der Lösung unverdünnt gespült
 werden.

Dequonal, Lösung zum Sprühen
 Sprühen Sie alle zwei Stunden – in schweren
 Fällen auch häufiger – mit 3-5 Sprühstößen
 die Dequonal-Lösung in die Mundhöhle.

Die erkrankten Stellen in der Mundhöhle
 sollten Sie bei angehaltenem Atem besprühen.
 Hierzu drücken Sie das Sprühventil 3-5mal
 bis zum Anschlag nieder (pumpen)!

Art der Anwendung

Wenden Sie Dequonal in der Mundhöhle an.

Dauer der Anwendung

Dequonal soll ohne ärztlichen bzw.
 zahnärztlichen Rat nicht längerfristig
 angewendet werden. Sollten die Beschwer-
 den von Fieber begleitet werden oder die
 Beschwerden nicht nach spätestens 3 Tagen
 erheblich nachlassen, ist ein Arzt aufzusuchen,
 da eine behandlungsbedürftige Entzündung
 vorliegen kann, die ernste Folgen an Herz
 und Nieren auslösen kann.

Wenn Sie eine größere Menge Dequonal
angewendet haben, als Sie sollten

Ein Verschlucken von Dequonal ist
 unschädlich, Vergiftungserscheinungen nach
 Schlucken von Dequonal-Lösung sind nicht
 bekannt.

Weitere Fragen

Sollten Sie weitere Fragen zur Anwendung
 des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren
 Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind
möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Dequonal
 Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei
 jedem auftreten müssen.

Selten (weniger als 1 Behandelter von
1 000) können auftreten:

- Überempfindlichkeit
- Verfärbungen von Zunge, Zähnen oder
Prothesen

Sehr selten (weniger als 1 Behandelter
von 10 000) können auftreten:

- Lokale allergische und nicht allergische
Reaktionen (z. B. Schwellung, Quaddeln,
Schleimhautreizungen, Juckreiz,
vereinzelt auch mit Atemnot)
- Geschmacksstörungen

Mit nicht bekannter Häufigkeit (auf
Grundlage der verfügbaren Daten nicht
abschätzbar) können auftreten:

- Anaphylaktische Reaktionen (mit
Begleitsymptomen)
- Sensibilisierung (Ausbildung einer
Überempfindlichkeit gegenüber den
Wirkstoffen oder einen der sonstigen
Bestandteile)
- Kehlkopfkrampf bei Säuglingen und
Kindern bis zu 2 Jahren mit der
Folge schwerer Atemstörungen durch
Levomenthol
- Anschwellung der Rachenschleimhaut
- Entzündung der Mundschleimhaut
- Verzögerung der Wundheilung bei
Anwendung auf Wunden

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken,
 wenden Sie sich an Ihren Arzt, Zahnarzt
 oder Apotheker. Dies gilt auch für
 Nebenwirkungen, die nicht in dieser
 Packungsbeilage angegeben sind. Sie
 können Nebenwirkungen auch direkt dem
 Bundesinstitut für Arznei-
 mittel und Medizinprodukte, Abt.
 Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger
 Allee 3, D-53175 Bonn, Website:
 www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie
 Nebenwirkungen melden, können Sie dazu
 beitragen, dass mehr Informationen über die
 Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung
 gestellt werden.

5. Wie ist Dequonal aufzubewahren?

Bewahren Sie alle Arzneimittel für Kinder
 unzugänglich auf.

5.1 Hinweis zum Verfallsdatum

Das Verfallsdatum dieser Packung ist
 auf dem Behältnis und der Faltschachtel
 aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung
 bitte nicht mehr nach diesem Datum.

5.2 Aufbewahrungsbedingungen

Nicht über 25°C aufbewahren.

5.3 Haltbarkeit nach Anbruch

Dequonal ist nach Anbruch 3 Monate haltbar.

6. Weitere Informationen

6.1 Was Dequonal enthält

10 g Lösung zur Anwendung in der
 Mundhöhle enthalten:

als arzneilich wirksame Bestandteile:
 Dequaliniumchlorid 1,5 mg
 Benzalkoniumchlorid 3,5 mg

als weitere Bestandteile:
 Ethanol 96 %, Glycerol, Levomenthol,
 Macrogolglycerolhydroxystearat (Ph. Eur.),
 Minzöl, Natriumdihydrogenphosphat-
 Dihydrat, Natriumhydroxid, Pfefferminzöl,
 gereinigtes Wasser.

6.2 Wie Dequonal aussieht und Inhalt
der Packung

Dequonal ist in Packungen mit 1 Flasche zu
 200 ml gebrauchsfertiger Gurgellösung
 zur Anwendung in der Mundhöhle erhältlich.
 Dequonal ist in Packungen mit
 1 Sprühflasche zum Pumpen (ohne Treibgas)
 zu 50 ml Lösung zur Anwendung in der
 Mundhöhle erhältlich.

6.3 Pharmazeutischer Unternehmer und
Hersteller

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH
 Rheingaustraße 87-93
 D-65203 Wiesbaden
 www.kreussler.com
 E-Mail: info@kreussler.com

6.4 Stand der Information

September 2025

Eigenschaften

Dequonal ist eine gebrauchsfertige, unge-
 färbte, wasserklare Lösung und braucht nicht
 verdünnt zu werden.
 Dequonal wird zur unterstützenden
 zeitweiligen Behandlung bei Entzündungen
 im Mund angewendet.
 Dequonal unterstützt die Linderung des
 Schmerzes und lässt die Entzündungen
 schnell abklingen.
 Die Bildung von Zahnbelägen wird
 vermindert.
 Dem natürlichen Geschmack nach Fenchel
 und Pfefferminze ist es zu verdanken, dass
 Dequonal auch von Kindern gern
 angewendet wird.
 Kinder und ältere oder schwerkranke
 Patienten, die nicht in der Lage sind zu
 gurgeln, können mit der Sprühlösung
 behandelt werden. Auch auf Reisen
 und am Arbeitsplatz ist die Dequonal
 Sprühlösung bequem anwendbar.

Hinweis

In der Sprühflasche bleibt ein kleiner Rest
 Dequonal zurück, dem aber schon durch
 eine entsprechende
 erhöhte Abfüllmenge Rechnung getragen
 wurde. Es ist also sichergestellt, dass der an-
 gegebene Inhalt von 50 ml voll genutzt wer-
 den kann.
 Apothekenpflichtig
 Zulassungsnummer: 6430539.00.00

Package leaflet

DEQUONAL®

1.5 / 3.5 mg solution

For adults and children

Dear patient!

Please read all of this leaflet carefully because it contains important information for you.

This medicine is available without prescription. However, you still need to use Dequonal according to the instructions to get the best results.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- Ask your pharmacist if you need more information or advice.
- In case of acute disease, you must talk to a doctor if you do not feel better after a couple of days.

What is in this leaflet

1. What Dequonal is and what it is used for
2. What you need to know before you use Dequonal
3. How to use Dequonal
4. Possible side effects
5. How to store Dequonal
6. Other information

1. What Dequonal is and what it is used for

Dequonal is a ready-to-use medicine for oromucosal use, based on dequalinium chloride and benzalkonium chloride. Dequonal is used for:

- temporary supportive treatment of inflammation of the oral mucosa.
- temporary use in case of bad breath (if caused by germs in the oral cavity).

2. What you need to know before you use Dequonal

2.1 Do not use Dequonal in

- case of known hypersensitivity to dequalinium, benzalkonium chloride or any of the other ingredients.
- infants and toddlers up to 2 years of age (risk of laryngeal spasm due to levomenthol).
- patients with bronchial asthma or other respiratory diseases associated with pronounced hypersensitivity of the airways. Due to its levomenthol content, inhaling Dequonal can cause breathing difficulties or trigger an asthmatic attack.
- Do not use on wounds.

2.2 Take special care with Dequonal

- Children: Dequonal should only be used for rinsing or gargling if the patient masters the gargling technique. Therefore, the use e.g. in infants and toddlers is not suitable.
- Contact allergy: Patients with allergic contact allergies should not use the active substances of Dequonal (dequalinium chloride and benzalkonium chloride) as sensitization is possible.
- Eyes: Avoid medicine contact with eyes.

2.3 Using Dequonal with other medicines or other substances

Interactions with other medicines are not known. However, please tell your doctor or pharmacist if you are taking, or have recently taken, any other medicines, including medicines obtained without a prescription. The active substances of Dequonal are inactivated by protein, serum, and pus and are diminished in the presence of conventional soaps, furthermore by anionic, surface-active substances, materials such as porous substances (rubber, cotton, cork) and plastic materials (polyvinyl chloride, polyethylene), phospholipids and other substances containing lipids.

2.4 Pregnancy and breast-feeding

No adequate safety data on the use of Dequonal in pregnant women is available. If you are pregnant, only use Dequonal if your attending doctor considers it absolutely necessary. It is not known whether the active substances of Dequonal are excreted into breast milk. Therefore, Dequonal should not be used by breast-feeding women unless their attending doctor considers it absolutely necessary.

2.5 Driving and using machines

Dequonal has no known negative effects on the ability to drive and use machines. No precautions are required.

2.6 Important information about some of the ingredients of Dequonal

Dequonal contains 6% alcohol by volume. People who suffered from alcohol abuse in the past could experience relapse if they use Dequonal. Benzalkonium chloride and macrogolglycerol hydroxystearate can cause skin irritation.

3. How to use Dequonal

Please use this medicine as described in this leaflet, otherwise Dequonal is less effective.

Preparing the pump

To remove air from the spray nozzle, operate the pump 6 times before using the spray for the first time and after more than 3 days of non-use.

Dosage

Dequonal, gargle

In the morning and evening, after the meals, rinse with 5 ml of the undiluted solution.

Dequonal, spray

Every two hours – in severe case even more frequently – spray Dequonal 3-5 times into the oral cavity. Spray the affected areas in the oral cavity while holding your breath. To do so, press the spray valve 3-5 times down to the stop! (pump)!

Method of administration

Use Dequonal in the oral cavity.

Duration of use

Dequonal should not be used for extended periods without medical or dental advice. If the disease is accompanied by fever or if the symptoms do not improve significantly after 3 days at the latest, a doctor must be consulted. An underlying inflammation requiring treatment may exist, which could have serious consequences on heart and kidneys.

If you use more Dequonal than you should

Swallowing Dequonal is harmless, symptoms of poisoning after swallowing Dequonal solution are not known.

Further questions

If you have further questions on the administration of the medicine, ask your doctor or pharmacist.

4. Possible side effects

Like all medicines, Dequonal can cause side effects, although not everybody gets them.

Rarely (up to 1 in 1,000 treated people) may occur:

- Hypersensitivity
- Discoloration of tongue, teeth or dentures

Very rarely (up to 1 in 10,000 treated people) may occur:

- Local allergic and non-allergic reactions (e.g. swelling, wheals, mucosal irritation, itching, sporadically also with breathing difficulties)
- Taste disorders

With unknown frequency (cannot be estimated from the available data) may occur:

- Anaphylactic reactions (with accompanying symptoms)
- Allergization (development of hypersensitivity to the active substances or to one of the other ingredients)
- Laryngeal spasm caused by levomenthol in infants and toddlers up to 2 years of age with consequential severe breathing difficulties
- Swelling of the mucous membrane of the throat
- Oromucosal inflammation
- Delayed wound healing if applied on wounds

Reporting of side effects

If you get any side effects, talk to your doctor, dentist or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. You can also report side effects directly via Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, website: www.bfarm.de. By reporting side effects, you can help provide more information on the safety of this medicine.

5. How to store Dequonal

Keep all medicines out of the sight and reach of children.

5.1 Shelf life information

The expiry date of this pack is printed on the container and carton. Please do not use this pack after that date.

5.2 Storage conditions

Do not store above 25° C.

5.3 Shelf life after first opening

After first opening Dequonal has a shelf life of 3 months.

6. Other information

6.1 What Dequonal contains

10 g oromucosal solution contain:

as active substances:

Dequalinium chloride 1.5 mg
Benzalkonium chloride 3.5 mg

as other ingredients:

Ethanol 96%, glycerol, levomenthol, macrogolglycerol hydroxystearate (Ph. Eur.), mint oil, sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium hydroxide, peppermint oil, purified water.

6.2 What Dequonal looks like and contents of the pack

Dequonal is available in packs of 1 bottle of 200 ml ready-to-use gargle for oromucosal use. Dequonal is available in packs of 1 bottle with spray pump (without gas propellant) of 50 ml oromucosal solution.

6.3 Marketing Authorisation Holder and Manufacturer

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH
Rheingaustraße 87-93
D-65203 Wiesbaden, Germany
www.kreussler.com
E-mail: info@kreussler.com

6.4 Date of revision of the text

September 2025

Properties

Dequonal is a ready-to-use, colourless, water-clear solution and does not need to be diluted. Dequonal is used for temporary supportive treatment of inflammation in the mouth. Dequonal supports pain relief and resolves the inflammation quickly. Dental plaque formation is reduced. Thanks to its natural taste of fennel and peppermint, Dequonal is also popular with children. Children and elderly or critically ill patients who are unable to gargle can be treated with the spray. Dequonal spray is also convenient when travelling and at the workplace.

Note

A small amount of Dequonal remains in the spray bottle, but this has already been taken into account by increasing the filling quantity accordingly. It is therefore ensured that the specified content of 50 ml can be used completely. Pharmacy only
Marketing Authorisation Number: 6430539.00.00