

GEBRAUCHSINFORMATION: Information für Anwender

Docetaxel STADA® 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

<p>Docetaxel</p>
<p>Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.</p> <ul style="list-style-type: none">Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

- Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet?
- Was sollten Sie vor der Anwendung von Docetaxel STADA® beachten?
- Wie ist Docetaxel STADA® anzuwenden?
- Welche Nebenwirkungen sind möglich?
- Wie ist Docetaxel STADA® aufzubewahren?
- Inhalt der Packung und weitere Informationen

<p>1. Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet?</p>

Der Name dieses Arzneimittels lautet Docetaxel STADA®. Sein gebräuchlicher Name ist Docetaxel. Docetaxel ist eine Substanz, die aus Eibennadeln gewonnen wird.

Docetaxel gehört zur Gruppe der als Taxane bezeichneten Arzneimittel, die gegen Krebs wirksam sind.

Docetaxel STADA® wurde von Ihrem Arzt zur Behandlung von Brustkrebs, bestimmten Formen von Lungenkrebs (nicht-kleinzelliges Bronchialkarzinom), Prostatakarzinom, Magenkarzinom oder Kopf-Hals-Tumoren verschrieben:

- Für die Behandlung von fortgeschrittenem Brustkrebs kann Docetaxel STADA® entweder allein oder in Kombination mit Doxorubicin, Trastuzumab oder Capecitabin verabreicht werden.
- Für die Behandlung von Brustkrebs im frühen Stadium mit oder ohne Beteiligung von Lymphknoten kann Docetaxel STADA® in Kombination mit Doxorubicin und Cyclophosphamid verabreicht werden.
- Für die Behandlung von Lungenkrebs kann Docetaxel STADA® entweder allein oder in Kombination mit Cisplatin verabreicht werden.
- Für die Behandlung des Prostatakarzinoms wird Docetaxel STADA® in Kombination mit Prednison oder Prednisolon gegeben.
- Für die Behandlung des metastasierten Magenkarzinoms wird Docetaxel STADA® in Kombination mit Cisplatin und 5-Fluorouracil gegeben.
- Für die Behandlung von Kopf-Hals-Tumoren wird Docetaxel STADA® in Kombination mit Cisplatin und 5-Fluorouracil gegeben.

<p>2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Docetaxel STADA® beachten?</p>

Docetaxel STADA® darf Ihnen nicht gegeben werden,

- wenn Sie allergisch gegen Docetaxel oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind,
- wenn die Zahl Ihrer weißen Blutkörperchen zu gering ist,
- wenn Sie eine schwere Lebererkrankung haben.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Vor jeder Behandlung mit Docetaxel STADA® müssen Sie sich einem Bluttest unterziehen, um feststellen zu lassen, ob Sie ausreichend Blutzellen und eine entsprechende Leberfunktion haben, um Docetaxel STADA® erhalten zu können. Im Falle einer Beeinträchtigung der weißen Blutzellen können bei Ihnen Fieber oder Infektionen auftreten.

Informieren Sie unverzüglich Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal, wenn Sie Bauchschmerzen oder Druckschmerz, Durchfall, Rektalblutung, Blut im Stuhl oder

<p>Docetaxel</p>
<p>Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.</p> <ul style="list-style-type: none">Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
<p>Was in dieser Packungsbeilage steht</p> <ol style="list-style-type: none">Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet? Was sollten Sie vor der Anwendung von Docetaxel STADA® beachten? Wie ist Docetaxel STADA® anzuwenden? Welche Nebenwirkungen sind möglich? Wie ist Docetaxel STADA® aufzubewahren? Inhalt der Packung und weitere Informationen
<p>1. Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet?</p>
<p>Der Name dieses Arzneimittels lautet Docetaxel STADA®. Sein gebräuchlicher Name ist Docetaxel. Docetaxel ist eine Substanz, die aus Eibennadeln gewonnen wird.</p> <p>Docetaxel gehört zur Gruppe der als Taxane bezeichneten Arzneimittel, die gegen Krebs wirksam sind.</p>
<p>Docetaxel STADA® wurde von Ihrem Arzt zur Behandlung von Brustkrebs, bestimmten Formen von Lungenkrebs (nicht-kleinzelliges Bronchialkarzinom), Prostatakarzinom, Magenkarzinom oder Kopf-Hals-Tumoren verschrieben:</p> <ul style="list-style-type: none">Für die Behandlung von fortgeschrittenem Brustkrebs kann Docetaxel STADA® entweder allein oder in Kombination mit Doxorubicin, Trastuzumab oder Capecitabin verabreicht werden. Für die Behandlung von Brustkrebs im frühen Stadium mit oder ohne Beteiligung von Lymphknoten kann Docetaxel STADA® in Kombination mit Doxorubicin und Cyclophosphamid verabreicht werden. Für die Behandlung von Lungenkrebs kann Docetaxel STADA® entweder allein oder in Kombination mit Cisplatin verabreicht werden. Für die Behandlung des Prostatakarzinoms wird Docetaxel STADA® in Kombination mit Prednison oder Prednisolon gegeben. Für die Behandlung des metastasierten Magenkarzinoms wird Docetaxel STADA® in Kombination mit Cisplatin und 5-Fluorouracil gegeben. Für die Behandlung von Kopf-Hals-Tumoren wird Docetaxel STADA® in Kombination mit Cisplatin und 5-Fluorouracil gegeben.
<p>2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Docetaxel STADA® beachten?</p>
<p>Docetaxel STADA® darf Ihnen nicht gegeben werden,</p> <ul style="list-style-type: none">wenn Sie allergisch gegen Docetaxel oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind, wenn die Zahl Ihrer weißen Blutkörperchen zu gering ist, wenn Sie eine schwere Lebererkrankung haben.
<p>Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen</p> <p>Vor jeder Behandlung mit Docetaxel STADA® müssen Sie sich einem Bluttest unterziehen, um feststellen zu lassen, ob Sie ausreichend Blutzellen und eine entsprechende Leberfunktion haben, um Docetaxel STADA® erhalten zu können. Im Falle einer Beeinträchtigung der weißen Blutzellen können bei Ihnen Fieber oder Infektionen auftreten.</p>
<p>Informieren Sie unverzüglich Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal, wenn Sie Bauchschmerzen oder Druckschmerz, Durchfall, Rektalblutung, Blut im Stuhl oder</p>
<p>Docetaxel</p>

<p>Docetaxel</p>
<p>Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.</p> <ul style="list-style-type: none">Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
<p>Was in dieser Packungsbeilage steht</p> <ol style="list-style-type: none">Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet? Was sollten Sie vor der Anwendung von Docetaxel STADA® beachten? Wie ist Docetaxel STADA® anzuwenden? Welche Nebenwirkungen sind möglich? Wie ist Docetaxel STADA® aufzubewahren? Inhalt der Packung und weitere Informationen
<p>1. Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet?</p>
<p>Der Name dieses Arzneimittels lautet Docetaxel STADA®. Sein gebräuchlicher Name ist Docetaxel. Docetaxel ist eine Substanz, die aus Eibennadeln gewonnen wird.</p> <p>Docetaxel gehört zur Gruppe der als Taxane bezeichneten Arzneimittel, die gegen Krebs wirksam sind.</p>
<p>Docetaxel STADA® wurde von Ihrem Arzt zur Behandlung von Brustkrebs, bestimmten Formen von Lungenkrebs (nicht-kleinzelliges Bronchialkarzinom), Prostatakarzinom, Magenkarzinom oder Kopf-Hals-Tumoren verschrieben:</p> <ul style="list-style-type: none">Für die Behandlung von fortgeschrittenem Brustkrebs kann Docetaxel STADA® entweder allein oder in Kombination mit Doxorubicin, Trastuzumab oder Capecitabin verabreicht werden. Für die Behandlung von Brustkrebs im frühen Stadium mit oder ohne Beteiligung von Lymphknoten kann Docetaxel STADA® in Kombination mit Doxorubicin und Cyclophosphamid verabreicht werden. Für die Behandlung von Lungenkrebs kann Docetaxel STADA® entweder allein oder in Kombination mit Cisplatin verabreicht werden. Für die Behandlung des Prostatakarzinoms wird Docetaxel STADA® in Kombination mit Prednison oder Prednisolon gegeben. Für die Behandlung des metastasierten Magenkarzinoms wird Docetaxel STADA® in Kombination mit Cisplatin und 5-Fluorouracil gegeben. Für die Behandlung von Kopf-Hals-Tumoren wird Docetaxel STADA® in Kombination mit Cisplatin und 5-Fluorouracil gegeben.
<p>2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Docetaxel STADA® beachten?</p>
<p>Docetaxel STADA® darf Ihnen nicht gegeben werden,</p> <ul style="list-style-type: none">wenn Sie allergisch gegen Docetaxel oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind, wenn die Zahl Ihrer weißen Blutkörperchen zu gering ist, wenn Sie eine schwere Lebererkrankung haben.
<p>Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen</p> <p>Vor jeder Behandlung mit Docetaxel STADA® müssen Sie sich einem Bluttest unterziehen, um feststellen zu lassen, ob Sie ausreichend Blutzellen und eine entsprechende Leberfunktion haben, um Docetaxel STADA® erhalten zu können. Im Falle einer Beeinträchtigung der weißen Blutzellen können bei Ihnen Fieber oder Infektionen auftreten.</p>
<p>Informieren Sie unverzüglich Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal, wenn Sie Bauchschmerzen oder Druckschmerz, Durchfall, Rektalblutung, Blut im Stuhl oder</p>
<p>Docetaxel</p>

Fieber haben. Diese Symptome können erste Anzeichen einer schwerwiegenden Schädigung des Magen-Darm-Trakts sein, die tödlich verlaufen kann. Ihr Arzt muss diese Anzeichen unverzüglich behandeln.

<p>Docetaxel</p>
<p>Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.</p> <ul style="list-style-type: none">Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
<p>Was in dieser Packungsbeilage steht</p> <ol style="list-style-type: none">Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet? Was sollten Sie vor der Anwendung von Docetaxel STADA® beachten? Wie ist Docetaxel STADA® anzuwenden? Welche Nebenwirkungen sind möglich? Wie ist Docetaxel STADA® aufzubewahren? Inhalt der Packung und weitere Informationen
<p>1. Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet?</p>
<p>Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal, wenn Sie Sehprobleme haben. Im Fall von Sehproblemen, insbesondere bei Verschwommensehen, sollten Ihre Augen und Ihr Sehvermögen unverzüglich untersucht werden.</p>

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal, wenn Sie unter einer früheren Therapie mit einem Paclitaxel-haltigen Arzneimittel eine allergische Reaktion hatten.

<p>Docetaxel</p>
<p>Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.</p> <ul style="list-style-type: none">Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
<p>Was in dieser Packungsbeilage steht</p> <ol style="list-style-type: none">Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet? Was sollten Sie vor der Anwendung von Docetaxel STADA® beachten? Wie ist Docetaxel STADA® anzuwenden? Welche Nebenwirkungen sind möglich? Wie ist Docetaxel STADA® aufzubewahren? Inhalt der Packung und weitere Informationen
<p>1. Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet?</p>
<p>Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal, wenn Sie Probleme mit Ihrem Herzen haben.</p>

<p>Docetaxel</p>
<p>Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.</p> <ul style="list-style-type: none">Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
<p>Was in dieser Packungsbeilage steht</p> <ol style="list-style-type: none">Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet? Was sollten Sie vor der Anwendung von Docetaxel STADA® beachten? Wie ist Docetaxel STADA® anzuwenden? Welche Nebenwirkungen sind möglich? Wie ist Docetaxel STADA® aufzubewahren? Inhalt der Packung und weitere Informationen
<p>1. Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet?</p>
<p>Wenn Sie akute Lungenprobleme haben oder sich diese verschlechtern (Fieber, Kurzatmigkeit oder Husten), informieren Sie bitte sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Ihr Arzt kann die Behandlung sofort unterbrechen.</p>

<p>Docetaxel</p>
<p>Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.</p> <ul style="list-style-type: none">Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
<p>Was in dieser Packungsbeilage steht</p> <ol style="list-style-type: none">Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet? Was sollten Sie vor der Anwendung von Docetaxel STADA® beachten? Wie ist Docetaxel STADA® anzuwenden? Welche Nebenwirkungen sind möglich? Wie ist Docetaxel STADA® aufzubewahren? Inhalt der Packung und weitere Informationen
<p>1. Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet?</p>
<p>Sie werden gebeten, einen Tag vor der Verabreichung von Docetaxel STADA® eine Prämedikation einzunehmen, die aus einem oralen Kortikosteroid wie Dexamethason besteht, und diese für einen oder 2 weitere Tage fortzusetzen, um bestimmte unerwünschte Wirkungen, insbesondere allergische Reaktionen und Flüssigkeitseinlagerungen (Anschwellen der Hände, Füße, Beine und Gewichtszunahme), die nach der Infusion von Docetaxel STADA® auftreten können, möglichst gering zu halten.</p>

<p>Docetaxel</p>
<p>Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.</p> <ul style="list-style-type: none">Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
<p>Was in dieser Packungsbeilage steht</p> <ol style="list-style-type: none">Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet? Was sollten Sie vor der Anwendung von Docetaxel STADA® beachten? Wie ist Docetaxel STADA® anzuwenden? Welche Nebenwirkungen sind möglich? Wie ist Docetaxel STADA® aufzubewahren? Inhalt der Packung und weitere Informationen
<p>1. Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet?</p>
<p>Während der Behandlung können Ihnen andere Arzneimittel zur Aufrechterhaltung der Zahl Ihrer Blutzellen verabreicht werden.</p>

<p>Docetaxel</p>
<p>Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.</p> <ul style="list-style-type: none">Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
<p>Was in dieser Packungsbeilage steht</p> <ol style="list-style-type: none">Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet? Was sollten Sie vor der Anwendung von Docetaxel STADA® beachten? Wie ist Docetaxel STADA® anzuwenden? Welche Nebenwirkungen sind möglich? Wie ist Docetaxel STADA® aufzubewahren? Inhalt der Packung und weitere Informationen
<p>1. Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet?</p>
<p>Schwere Hautprobleme wie Stevens-Johnson-Syndrom (SJS), toxische epidermale Nekrolyse (TEN) und akutes generalisierendes pustulöses Exanthem (AGEP) wurden unter Docetaxel berichtet:</p> <ul style="list-style-type: none">SJS/TEN können folgende Symptome haben: Blasenbildung, Ablösen der Haut oder Blutungen an jeglicher Hautstelle (einschließlich der Lippen, Augen, Mund, Nase, Genitalien, Hände oder Füße) mit oder ohne Ausschlag. Grippeähnliche Symptome wie Fieber, Schüttelfrost und Muskelschmerzen können zeitgleich auftreten.

- AGEP kann folgende Symptome haben: großflächiger, roter und schuppiger Ausschlag mit Beulen unter der geschwollenen Haut (einschließlich Hautfalten, Rumpf und der oberen Extremitäten) und Blasen verbunden mit Fieber.

Wenn Sie schwere Hautreaktionen oder eine der oben aufgeführten Reaktionen haben, kontaktieren Sie unverzüglich Ihren Arzt oder das medizinische Fachpersonal.

<p>Docetaxel</p>
<p>Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.</p> <ul style="list-style-type: none">Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
<p>Was in dieser Packungsbeilage steht</p> <ol style="list-style-type: none">Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet? Was sollten Sie vor der Anwendung von Docetaxel STADA® beachten? Wie ist Docetaxel STADA® anzuwenden? Welche Nebenwirkungen sind möglich? Wie ist Docetaxel STADA® aufzubewahren? Inhalt der Packung und weitere Informationen
<p>1. Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet?</p>
<p>Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal vor Beginn der Behandlung mit Docetaxel, wenn Sie Nierenprobleme oder hohe Harnsäurespiegel im Blut haben.</p>

<p>Docetaxel</p>
<p>Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.</p> <ul style="list-style-type: none">Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
<p>Was in dieser Packungsbeilage steht</p> <ol style="list-style-type: none">Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet? Was sollten Sie vor der Anwendung von Docetaxel STADA® beachten? Wie ist Docetaxel STADA® anzuwenden? Welche Nebenwirkungen sind möglich? Wie ist Docetaxel STADA® aufzubewahren? Inhalt der Packung und weitere Informationen
<p>1. Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet?</p>
<p>Docetaxel STADA® enthält Alkohol. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie alkoholkrank sind, wenn Sie an Epilepsie leiden oder wenn Ihre Leberfunktion eingeschränkt ist. Siehe auch Abschnitt „Docetaxel STADA® enthält Ethanol (Alkohol)“ im Folgenden.</p>

Anwendung von Docetaxel STADA® zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt, da Docetaxel STADA® oder andere Arzneimittel nicht so gut wie erwartet wirken und bei Ihnen mit größerer Wahrscheinlichkeit Nebenwirkungen auftreten könnten.

<p>Docetaxel</p>
<p>Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.</p> <ul style="list-style-type: none">Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
<p>Was in dieser Packungsbeilage steht</p> <ol style="list-style-type: none">Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet? Was sollten Sie vor der Anwendung von Docetaxel STADA® beachten? Wie ist Docetaxel STADA® anzuwenden? Welche Nebenwirkungen sind möglich? Wie ist Docetaxel STADA® aufzubewahren? Inhalt der Packung und weitere Informationen
<p>1. Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet?</p>
<p>Die Wirkung anderer Arzneimittel kann durch den Alkohol in diesem Arzneimittel verändert werden.</p>

<p>Docetaxel</p>
<p>Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.</p> <ul style="list-style-type: none">Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
<p>Was in dieser Packungsbeilage steht</p> <ol style="list-style-type: none">Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet? Was sollten Sie vor der Anwendung von Docetaxel STADA® beachten? Wie ist Docetaxel STADA® anzuwenden? Welche Nebenwirkungen sind möglich? Wie ist Docetaxel STADA® aufzubewahren? Inhalt der Packung und weitere Informationen
<p>1. Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet?</p>
<p>Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit</p> <p>Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt um Rat.</p>

<p>Docetaxel</p>
<p>Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.</p> <ul style="list-style-type: none">Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
<p>Was in dieser Packungsbeilage steht</p> <ol style="list-style-type: none">Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet? Was sollten Sie vor der Anwendung von Docetaxel STADA® beachten? Wie ist Docetaxel STADA® anzuwenden? Welche Nebenwirkungen sind möglich? Wie ist Docetaxel STADA® aufzubewahren? Inhalt der Packung und weitere Informationen
<p>1. Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet?</p>
<p>Docetaxel STADA® darf NICHT verabreicht werden, wenn Sie schwanger sind, es sei denn, Ihr Arzt hält dies für eindeutig erforderlich.</p>

<p>Docetaxel</p>
<p>Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.</p> <ul style="list-style-type: none">Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
<p>Was in dieser Packungsbeilage steht</p> <ol style="list-style-type: none">Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet? Was sollten Sie vor der Anwendung von Docetaxel STADA® beachten? Wie ist Docetaxel STADA® anzuwenden? Welche Nebenwirkungen sind möglich? Wie ist Docetaxel STADA® aufzubewahren? Inhalt der Packung und weitere Informationen
<p>1. Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet?</p>
<p>Sie dürfen während der Behandlung mit diesem Arzneimittel nicht schwanger werden und müssen während der Therapie eine zuverlässige Verhütungsmethode anwenden, da Docetaxel STADA® dem ungeborenen Kind schaden kann. Wenn Sie während Ihrer Behandlung schwanger werden, müssen Sie umgehend Ihren Arzt verständigen.</p>

<p>Docetaxel</p>
<p>Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.</p> <ul style="list-style-type: none">Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
<p>Was in dieser Packungsbeilage steht</p> <ol style="list-style-type: none">Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet? Was sollten Sie vor der Anwendung von Docetaxel STADA® beachten? Wie ist Docetaxel STADA® anzuwenden? Welche Nebenwirkungen sind möglich? Wie ist Docetaxel STADA® aufzubewahren? Inhalt der Packung und weitere Informationen
<p>1. Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet?</p>
<p>Sie dürfen während Ihrer Behandlung mit Docetaxel STADA® nicht stillen.</p>

<p>Docetaxel</p>
<p>Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.</p> <ul style="list-style-type: none">Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
<p>Was in dieser Packungsbeilage steht</p> <ol style="list-style-type: none">Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet? Was sollten Sie vor der Anwendung von Docetaxel STADA® beachten? Wie ist Docetaxel STADA® anzuwenden? Welche Nebenwirkungen sind möglich? Wie ist Docetaxel STADA® aufzubewahren? Inhalt der Packung und weitere Informationen
<p>1. Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet?</p>
<p>Wenn Sie als Mann mit Docetaxel STADA® behandelt werden, werden Sie darauf hingewiesen, während und bis zu 6 Monate nach der Behandlung, kein Kind zu zeugen und sich vor der Therapie hinsichtlich einer Spermakonservierung beraten zu lassen, da Docetaxel die männliche Fortpflanzungsfähigkeit verändern kann.</p>

<p>Docetaxel</p>
<p>Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.</p> <ul style="list-style-type: none">Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
<p>Was in dieser Packungsbeilage steht</p> <ol style="list-style-type: none">Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet? Was sollten Sie vor der Anwendung von Docetaxel STADA® beachten? Wie ist Docetaxel STADA® anzuwenden? Welche Nebenwirkungen sind möglich? Wie ist Docetaxel STADA® aufzubewahren? Inhalt der Packung und weitere Informationen
<p>1. Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet?</p>
<p>Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen</p> <p>Im Straßenverkehr und bei der Bedienung von Maschinen kann das Reaktionsvermögen beeinträchtigt werden. Es können Nebenwirkungen dieses Arzneimittels auftreten, die Ihre Fähigkeit, ein Fahrzeug zu führen, Werkzeuge zu benutzen oder Maschinen zu bedienen, beeinträchtigen können (siehe Abschnitt 4. „Welche Nebenwirkungen sind möglich?“). Wenn diese Nebenwirkungen auftreten, dürfen Sie kein Fahrzeug führen oder Werkzeuge und Maschinen bedienen, bevor Sie mit Ihrem Arzt, dem medizinischen Fachpersonal oder Apotheker gesprochen haben.</p>

<p>Docetaxel</p>
<p>Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.</p> <ul style="list-style-type: none">Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
<p>Was in dieser Packungsbeilage steht</p> <ol style="list-style-type: none">Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet? Was sollten Sie vor der Anwendung von Docetaxel STADA® beachten? Wie ist Docetaxel STADA® anzuwenden? Welche Nebenwirkungen sind möglich? Wie ist Docetaxel STADA® aufzubewahren? Inhalt der Packung und weitere Informationen
<p>1. Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet?</p>
<p>Docetaxel STADA® enthält Ethanol (Alkohol)</p> <p>Dieses Arzneimittel enthält 50 Vol.-% Ethanol (Alkohol). Das sind bis zu 3.160 mg Ethanol pro Durchstechflasche, entsprechend 80 ml Bier oder 33 ml Wein.</p>

<p>Docetaxel</p>
<p>Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.</p> <ul style="list-style-type: none">Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
<p>Was in dieser Packungsbeilage steht</p> <ol style="list-style-type: none">Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet? Was sollten Sie vor der Anwendung von Docetaxel STADA® beachten? Wie ist Docetaxel STADA® anzuwenden? Welche Nebenwirkungen sind möglich? Wie ist Docetaxel STADA® aufzubewahren? Inhalt der Packung und weitere Informationen
<p>1. Was ist Docetaxel STADA® und wofür wird es angewendet?</p>
<p>Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Patienten mit organischen Erkrankungen des Gehirns, Schwangeren, Stillenden und Kindern.</p>

||
||
||

