



PRODUKTESKRIVELSE

XTRASORB™ skumbandage er en stærkt absorberende hydrofil skumbandage, der er konstrueret til behandling af sårvede sår. Skummet har et sin overflade forlignet med patientens superabsorberende kolonneporel gel-linjal på den ene overflade, og en integrert PU-film på baksiden. Det superabsorberende lag omvander sårvedet til et gel, absorberer og holder på væske i skårntaklaget, hvilket bevare et optimalt balanceret fugtniveau i skårntakslaget i en længere periode.

Bandagen medvirker til at skabe et miljø, der er optimalt til heling af så, det skal den styre mængden af sårvede og beskytte mod uønsket udsmelt og for eksterne bakterier. Det superabsorberende gel-lag sikrer både effektiv beskyttelse og absorption.

XTRASORB™ skum kan laves med eller uden klæbende kant.

INDIKATIONER

Under tilsyn af sundhedspersonale sikrer XTRASORB™ skumbandage et fugtigt miljø, der fremmer sårheling. Bandagen er indiceret til let til stærkt sårvede sår, såsom:

- Diabetiske fotsår
- Bændår (venøse bændår, arterielle sår og bændår af blanded ætologi)
- Decubitus / tryksår (delvis og fulde tryksår)
- 1. og 2. grads brændsår af delvis tryksår
- Donorsteder, traumatiske sår og operationsår.

Siden bandagene kan absorbere og fasholde væske under tryk, er de egnede til anvendelse under kompression. Bandagene kan bruges for at fughedigt og beskyttelse i lippet af hele leingsprocessen.

XTRASORB™ skumbandage kan anvendes til meget sårvede sår. Væskemængden af væske vil være afgørende for holdbarheden af bandagen, og størrelse beror derfor overvejende af sårstørrelsen. Bandagen kan på legems skin anvendes til patienter, der modtager behandling for lokale eller systemiske infektioner.

KONTRAINDIKATIONER

XTRASORB™ skumbandage er ikke indiceret til sår af fuld tryksår, meget blødende sår eller treghelegradsforskrændinger. Bandagen er ikke egnet til behandling af tårne sår.

FORHOLDSDREGLER OG OBSERVATIONER

Før forsigtig. Bandagene stillerl garanteres ikke, hvis asken bekræftes og åbnes for at skin anvendes. Bandagen MÅ IKKE anvendes, hvis dette er sket.

- Produktet må kun anvendes en gang
- Anvend ikke efter udfældstødet.
- Sammen med andre polyuretaniskumbandager, såsom XTRASORB™ skum ikke anvendes sammen med litiumindholdende skoom Dakins (hyppoklortoplasering) eller bintovetelse.
- Ved overfølsomhed overfor bandagen, skal den fjernes og omridet skal omhyggeligt renses.
- Under kroppens naturlige helingsproces, fjernes ikke-levedygtigt væv fra sår (autolytisk fjernelse), der kan få sår til at se større ud. Hvis sår fortsætter med at blive større eller de første skår til bag, skal du differe dig med sundhedspersonale. Sår ber undersages når bandagen skiftes. Tag kontakt til sundhedspersonale, hvis der er tegn på infektion (fies smerte, øget rødme, sårdrængning), to kontakt med sundhedspersonale, hvis der er tegn på infektion (fies smerte, øget rødme, udsmelt af sår, øget blødning, urentet ændring i sårts tone og lugt, irritation, øget rødme og/eller betændelse); overfølsomhed (allergisk reaktion), ingen tegn på sår helges.
- Hvis der er varskeligt af fjernede bandager, bør den skylles med vand eller en steril saltvandopløsning.
- Sår der bærer understøttende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt (f.eks. brug af deforager kompression ved behandling af varicose eller dekompressionsforanstaltninger ved behandling af tryksår, systemiske antibiotika og hyppig overvågning ved behandling af skårntaklaget, kontrol af blod sukker med diabetes, etc.).
- En endring i bandagebehandling kan medføre øgede mængder væske, der kan nødvendiggøre en midlertidig øget trykphed af bandaskiftet.
- Sundhedspersonale bør jævnligt undersøge bandagen for blænde infektioner så, diabetiske sår og sår følge af artiel insufficiens i overensstemmelse med lokale standarder.
- Produktet må kun anvendes på en patient. Når det er brugt, bør det bortskaffes på behørig vis og ikke omarbejdes eller genanvendes.
- Før påbegyndelse af behandling, er det vigtigt at foretage passende vurdering af sår og patient.

SKIFT OG FJERNELSE AF BANDAGE

Udførligheden tydeliggjeder afhænger af patientens tilstand samt mængden af sårvede. For at fjerne en bandage med kants, skal du løse den klæbende film før du løfter bandagen fra sår.

- For at fjerne en bandage uden kants, skal du forsigtigt løfte hjørnerne på bandagen væk fra sår.
- Sæt ny bandage på, når XTRASORB™ skumbandage ikke kan absorbere længere eller hvis sårleingsprocessen fortsætter det.
- Rengør sårfladen før en bandage påføres.

BRUGSVEJLEDNING

Før XTRASORB™ skumbandage sættes på, skal sårdrænen rengøres efter behov. Vask bandagen, der gys, at skårntakslaget helt kan dække sår samt strække ud til rundt væv (med cirka 2,5 mm, mindre ved en lille bandage).

Tag den sterile bandage ud af emballagen. Hvis det er nødvendigt kan den ikke-klæbende bandage tilskrives. Vær dog opmærksom på, at at disse kan øge risikoen for, at produktet deklamerer på sårvede sår.

For påsæten en (klæbende) bandage med kants, skal du først fjerne en del af det hvide plastlag for at afklæbe den klæbende del på bandagen. Anbring og gød på plads, mens du fjerner den anden halvdel af det hvide plastlag. Gå forsigtigt bandagen fra sår ved at løse den anden halvdel af det hvide plastlag. Gå forsigtigt rundt på bandagen fra sår, så sår, at der er god kontakt mellem den klæbende film og huden omkring sår. Når bandagen sidder fast, skal du trække materialet, der sidder på bagden af fra væk, der der sidder midt på væk på bandagen.

Ved en ikke-klæbende bandage uden kants, bør en ekstra filmbandage eller lignende bandage anvendes for at sikre, at bandagen sidder fast. Ved meget sårvede sår, skal du sørge for at fastgøre filmen flugt på bandagen kanten.

VERFORSIGT: Anvend ikke produktet, hvis produktmiljøbalen er beskadiget. Opskrift ved rumtemperatur: 10 – 25 °C. Hold tids.

OPBEVARELSE OG RENGØRING

Opbevar bandagen i et tørt miljø, der er optimalt til heling af så, det skal den styre mængden af sårvede og beskytte mod uønsket udsmelt og for eksterne bakterier. Det superabsorberende gel-lag sikrer både effektiv beskyttelse og absorption.

XTRASORB™ skum kan laves med eller uden klæbende kant.

Under tilsyn af sundhedspersonale sikrer XTRASORB™ skumbandage et fugtigt miljø, der fremmer sårheling. Bandagen er indiceret til let til stærkt sårvede sår, såsom:

- Diabetiske fotsår
- Bændår (venøse bændår, arterielle sår og bændår af blanded ætologi)
- Decubitus / tryksår (delvis og fulde tryksår)
- 1. og 2. grads brændsår af delvis tryksår
- Donorsteder, traumatiske sår og operationsår.

Siden bandagene kan absorbere og fasholde væske under tryk, er de egnede til anvendelse under kompression. Bandagene kan bruges for at fughedigt og beskyttelse i lippet af hele leingsprocessen.

XTRASORB™ skumbandage kan anvendes til meget sårvede sår. Væskemængden af væske vil være afgørende for holdbarheden af bandagen, og størrelse beror derfor overvejende af sårstørrelsen. Bandagen kan på legems skin anvendes til patienter, der modtager behandling for lokale eller systemiske infektioner.

KONTRAINDIKATIONER

XTRASORB™ skumbandage er ikke indiceret til sår af fuld tryksår, meget blødende sår eller treghelegradsforskrændinger. Bandagen er ikke egnet til behandling af tårne sår.

FORHOLDSDREGLER OG OBSERVATIONER

Før forsigtig. Bandagene stillerl garanteres ikke, hvis asken bekræftes og åbnes for at skin anvendes. Bandagen MÅ IKKE anvendes, hvis dette er sket.

- Produktet må kun anvendes en gang
- Anvend ikke efter udfældstødet.
- Sammen med andre polyuretaniskumbandager, såsom XTRASORB™ skum ikke anvendes sammen med litiumindholdende skoom Dakins (hyppoklortoplasering) eller bintovetelse.
- Ved overfølsomhed overfor bandagen, skal den fjernes og omridet skal omhyggeligt renses.
- Under kroppens naturlige helingsproces, fjernes ikke-levedygtigt væv fra sår (autolytisk fjernelse), der kan få sår til at se større ud. Hvis sår fortsætter med at blive større eller de første skår til bag, skal du differe dig med sundhedspersonale. Sår ber undersages når bandagen skiftes. Tag kontakt til sundhedspersonale, hvis der er tegn på infektion (fies smerte, øget rødme, sårdrængning), to kontakt med sundhedspersonale, hvis der er tegn på infektion (fies smerte, øget rødme, udsmelt af sår, øget blødning, urentet ændring i sårts tone og lugt, irritation, øget rødme og/eller betændelse); overfølsomhed (allergisk reaktion), ingen tegn på sår helges.
- Hvis der er varskeligt af fjernede bandager, bør den skylles med vand eller en steril saltvandopløsning.
- Sår der bærer understøttende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt (f.eks. brug af deforager kompression ved behandling af varicose eller dekompressionsforanstaltninger ved behandling af tryksår, systemiske antibiotika og hyppig overvågning ved behandling af skårntaklaget, kontrol af blod sukker med diabetes, etc.).
- En endring i bandagebehandling kan medføre øgede mængder væske, der kan nødvendiggøre en midlertidig øget trykphed af bandaskiftet.
- Sundhedspersonale bør jævnligt undersøge bandagen for blænde infektioner så, diabetiske sår og sår følge af artiel insufficiens i overensstemmelse med lokale standarder.
- Produktet må kun anvendes på en patient. Når det er brugt, bør det bortskaffes på behørig vis og ikke omarbejdes eller genanvendes.
- Før påbegyndelse af behandling, er det vigtigt at foretage passende vurdering af sår og patient.

SKIFT OG FJERNELSE AF BANDAGE

Udførligheden tydeliggjeder afhænger af patientens tilstand samt mængden af sårvede. For at fjerne en bandage med kants, skal du løse den klæbende film før du løfter bandagen fra sår.

For at fjerne en bandage uden kants, skal du forsigtigt løfte hjørnerne på bandagen væk fra sår.

Sæt ny bandage på, når XTRASORB™ skumbandage ikke kan absorbere længere eller hvis sårleingsprocessen fortsætter det.

Rengør sårfladen før en bandage påføres.

BRUGSVEJLEDNING

Før XTRASORB™ skumbandage sættes på, skal sårdrænen rengøres efter behov. Vask bandagen, der gys, at skårntakslaget helt kan dække sår samt strække ud til rundt væv (med cirka 2,5 mm, mindre ved en lille bandage).

Tag den sterile bandage ud af emballagen. Hvis det er nødvendigt kan den ikke-klæbende bandage tilskrives. Vær dog opmærksom på, at at disse kan øge risikoen for, at produktet deklamerer på sårvede sår.

For påsæten en (klæbende) bandage med kants, skal du først fjerne en del af det hvide plastlag for at afklæbe den klæbende del på bandagen. Anbring og gød på plads, mens du fjerner den anden halvdel af det hvide plastlag. Gå forsigtigt bandagen fra sår ved at løse den anden halvdel af det hvide plastlag. Gå forsigtigt rundt på bandagen fra sår, så sår, at der er god kontakt mellem den klæbende film og huden omkring sår. Når bandagen sidder fast, skal du trække materialet, der sidder på bagden af fra væk, der der sidder midt på væk på bandagen.

Ved en ikke-klæbende bandage uden kants, bør en ekstra filmbandage eller lignende bandage anvendes for at sikre, at bandagen sidder fast. Ved meget sårvede sår, skal du sørge for at fastgøre filmen flugt på bandagen kanten.

VERFORSIGT: Anvend ikke produktet, hvis produktmiljøbalen er beskadiget. Opskrift ved rumtemperatur: 10 – 25 °C. Hold tids.

Opbevar bandagen i et tørt miljø, der er optimalt til heling af så, det skal den styre mængden af sårvede og beskytte mod uønsket udsmelt og for eksterne bakterier. Det superabsorberende gel-lag sikrer både effektiv beskyttelse og absorption.

XTRASORB™ Foam

XTRASORB™ skumbandage er en stærkt absorberende hydrofil skumbandage, produktet for bruk til behandling av sårvede sår. Skummet har et på sin overflade forlignet med patientens superabsorberende kolonneporel gel-linjal på den ene overflaten, og en integrert PU-film på baksiden. Det superabsorberende lag omvander sårvedet til et gel, absorberer og holder på væske i skårntaklaget, hvilket bevare et optimalt balanceret fugtniveau i skårntakslaget i en længere periode.

Bandagen medvirker til å skape et miljø, der er optimalt til heling af så, det skal den styre mængden av sårvede og beskytte mod uønsket utsmelt og for eksterne bakterier. Det superabsorberende gel-lag sikrer både effektiv beskyttelse og absorpsjon.

XTRASORB™ skum kan laves med eller uten klæbende kant.

INDIKASJONER

Under tilsyn av sundhedspersonale sikrer XTRASORB™ skumbandage fulgtige omgivelser for arbeiding ved å skape et miljø, der er optimalt til heling av så, det skal den styre mængden av sårvede og beskytte mot uønsket utsmelt og for eksterne bakterier. Det superabsorberende gel-lag sikrer både effektiv beskyttelse og absorpsjon.

- Diabetiske fotsår
- Bændår (venøse stasissår, arterielle sår og bændår av blandaet etiologi)
- Tryksår / sår (partielt og full tryksår)
- Tryksoår / sår (partielt og full tryksår)
- 1. og 2. grads brannår delvis tryksår
- Donorsteder og traumatisk og kirurgiske sår.

Siden bandagene kan absorbere og holde på væske under trykk, er de egnede til anvendelse under kompresjon. Bandagene kan brukes for å fughet og beskyttelse i lippet av hele leingsprosessen.

XTRASORB™ Foam-bandage kan brukes på svært væske sår. Væskemengden vil imidlertid bestemmes av den effektive bløddingsstørrelsen i bandagen, og størrelse overvåkes i forhold til dette.

XTRASORB™ Foam-bandage kan brukes på pasienter som er i behandling for en lokal eller systemisk infeksjon under veiledning av lege.

XTRASORB™ skumbandage kan på legems skin anvendes til pasienter, der modtager behandling for lokale eller systemiske infeksjoner.

KONTRAINDIKASJONER

XTRASORB™ skumbandage er ikke indikert til sår av fuld trykssår, meget blødende sår eller treghelegradsforskrændinger. Bandagen er ikke egnet til behandling av tårne sår.

FORHOLDSDREGLER OG OBSERVASJONER

Før forsiktig. Bandagene stillerl garanteres ikke, hvis asken bekræftes og åpnes for at skin anvendes. Bandagen MÅ IKKE anvendes, hvis dette er sket.

- Produktet må kun anvendes en gang
- Anvend ikke etter udfældstødet.
- Sammen med andre polyuretaniskumbandager, såsom XTRASORB™ skum ikke anvendes sammen med litiumindholdende skoom Dakins (hyppoklortoplasering) eller bintovetelse.
- Ved overfølsomhet overfor bandagen, skal den fjernes og omridet skal omhyggeligt renses.
- Under kroppens naturlige helingsproces, fjernes ikke-levedygtigt væv fra sår (autolytisk fjernelse), der kan få sår til at se større ut. Hvis sår fortsetter med å bli større eller de første skår til bag, skal du differe dig med sundhedspersonale. Sår ber undersages når bandagen skiftes. Tag kontakt til sundhedspersonale, hvis der er tegn på infeksjon (fies smerte, øget rødme, sårdrængning), to kontakt med sundhedspersonale, hvis der er tegn på infeksjon (fies smerte, øget rødme, udsmelt af sår, øget blødning, urentet ændring i sårts tone og lugt, irritasjon, øget rødme og/eller betændelse); overfølsomhed (allergisk reaktion), ingen tegn på sår helges.
- Hvis der er varskeligt af fjernede bandager, bør den skylles med vand eller en steril saltvandopløsning.
- Sår der bærer understøttende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt (f.eks. brug af deforager kompression ved behandling av varicose eller dekompressionsforanstaltninger ved behandling av tryksår, systemiske antibiotika og hyppig overvågning ved behandling av skårntaklaget, kontrol av blod sukker med diabetes, etc.).
- En endring i bandagebehandling kan medføre øgede mængder væske, der kan nødvendiggjøre en midlertidig øget trykphed av bandaskiftet.
- Sundhedspersonale bør jævnlig undersøke bandagen for blænde infeksjoner så, diabetiske sår og sår følge av artiel insufficiens i overensstemmelse med lokale standarder.
- Produktet må kun anvendes på en patient. Når det er brugt, bør det bortskaffes på behørig vis og ikke omarbejdes eller genanvendes.
- Før påbegyndelse av behandling, er det viktig å foreta passende vurdering av sår og patient.

SKIFT OG FJERNELSE AV BANDAGE

Udførligheten tydeliggjør avhænger av patientens tilstand samt mængden af sårvede. For at fjerne en bandage med kants, skal du løse den klæbende film før du løfter bandagen fra sår.

For at fjerne en bandage uden kants, skal du forsigtigt løfte hjørnerne på bandagen væk fra sår.

Sæt ny bandage på, når XTRASORB™ skumbandage ikke kan absorbere længere eller hvis sårleingsprocessen fortsætter det.

Rengør sårfladen før en bandage påføres.

BRUGSVEJLEDNING

Før XTRASORB™ skumbandage sættes på, skal sårdrænen rengøres efter behov. Vask bandagen, der gys, at skårntakslaget helt kan dække sår samt strække ud til rundt væv (med cirka 2,5 mm, mindre ved en lille bandage).

Tag den sterile bandage ud af emballagen. Hvis det er nødvendigt kan den ikke-klæbende bandage tilskrives. Vær dog opmærksom på, at at disse kan øge risikoen for, at produktet deklamerer på sårvede sår.

For påsæten en (klæbende) bandage med kants, skal du først fjerne en del af det hvide plastlag for at afklæbe den klæbende del på bandagen. Anbring og gød på plads, mens du fjerner den anden halvdel af det hvide plastlag. Gå forsigtigt bandagen fra sår ved at løse den anden halvdel af det hvide plastlag. Gå forsigtigt rundt på bandagen fra sår, så sår, at der er god kontakt mellem den klæbende film og huden omkring sår. Når bandagen sidder fast, skal du trække materialet, der sidder på bagden af fra væk, der der sidder midt på væk på bandagen.

Ved en ikke-klæbende bandage uden kants, bør en ekstra filmbandage eller lignende bandage anvendes for at sikre, at bandagen sidder fast. Ved meget sårvede sår, skal du sørge for at fastgøre filmen flugt på bandagen kanten.

VERFORSIGT: Anvend ikke produktet, hvis produktmiljøbalen er beskadiget. Opskrift ved rumtemperatur: 10 – 25 °C. Hold tids.

OPBEVARELSE OG RENGØRING

Opbevar bandagen i et tørt miljø, der er optimalt til heling af så, det skal den styre mængden af sårvede og beskytte mod uønsket udsmelt og for eksterne bakterier. Det superabsorberende gel-lag sikrer både effektiv beskyttelse og absorpsjon.

XTRASORB™ Foam

XTRASORB™ skumbandage er en stærkt absorberende hydrofil skumbandage, produktet for bruk til behandling av sårvede sår. Skummet har et på sin overflade forlignet med patientens superabsorberende kolonneporel gel-linjal på den ene overflaten, og en integrert PU-film på baksiden. Det superabsorberende lag omvander sårvedet til et gel, absorberer og holder på væske i skårntaklaget, hvilket bevare et optimalt balanceret fugtniveau i skårntakslaget i en længere periode.

Bandagen medvirker til å skape et miljø, der er optimalt til heling av så, det skal den styre mængden av sårvede og beskytte mot uønsket utsmelt og for eksterne bakterier. Det superabsorberende gel-lag sikrer både effektiv beskyttelse og absorpsjon.

XTRASORB™ skum kan laves med eller uten klæbende kant.

INDIKASJONER

Under tilsyn av sundhedspersonale sikrer XTRASORB™ skumbandage fulgtige omgivelser for arbeiding ved å skape et miljø, der er optimalt til heling av så, det skal den styre mængden av sårvede og beskytte mot uønsket utsmelt og for eksterne bakterier. Det superabsorberende gel-lag sikrer både effektiv beskyttelse og absorpsjon.

- Diabetiske fotsår
- Bændår (venøse stasissår, arterielle sår og bændår av blandaet etiologi)
- Tryksår / sår (partielt og full tryksår)
- Tryksoår / sår (partielt og full tryksår)
- 1. og 2. grads brannår delvis tryksår
- Donorsteder og traumatisk og kirurgiske sår.

Siden bandagene kan absorbere og holde på væske under trykk, er de egnede til anvendelse under kompresjon. Bandagene kan brukes for å fughet og beskyttelse i lippet av hele leingsprosessen.

XTRASORB™ Foam-bandage kan brukes på svært væske sår. Væskemengden vil imidlertid bestemmes av den effektive bløddingsstørrelsen i bandagen, og størrelse overvåkes i forhold til dette.

XTRASORB™ Foam-bandage kan brukes på pasienter som er i behandling for en lokal eller systemisk infeksjon under veiledning av lege.

XTRASORB™ skumbandage kan på legems skin anvendes til pasienter, der modtager behandling for lokale eller systemiske infeksjoner.

KONTRAINDIKASJONER

XTRASORB™ skumbandage er ikke indikert til sår av fuld trykssår, meget blødende sår eller treghelegradsforskrændinger. Bandagen er ikke egnet til behandling av tårne sår.

FORHOLDSDREGLER OG OBSERVASJONER

Før forsiktig. Bandagene stillerl garanteres ikke, hvis asken bekræftes og åpnes for at skin anvendes. Bandagen MÅ IKKE anvendes, hvis dette er sket.

- Produktet må kun anvendes en gang
- Anvend ikke etter udfældstødet.
- Sammen med andre polyuretaniskumbandager, såsom XTRASORB™ skum ikke anvendes sammen med litiumindholdende skoom Dakins (hyppoklortoplasering) eller bintovetelse.
- Ved overfølsomhet overfor bandagen, skal den fjernes og omridet skal omhyggeligt renses.
- Under kroppens naturlige helingsproces, fjernes ikke-levedygtigt væv fra sår (autolytisk fjernelse), der kan få sår til å se større ut. Hvis sår fortsetter med å bli større eller de første skår til bag, skal du differe dig med sundhedspersonale. Sår ber undersages når bandagen skiftes. Tag kontakt til sundhedspersonale, hvis der er tegn på infeksjon (fies smerte, øget rødme, sårdrængning), to kontakt med sundhedspersonale, hvis der er tegn på infeksjon (fies smerte, øget rødme, udsmelt af sår, øget blødning, urentet ændring i sårts tone og lugt, irritasjon, øget rødme og/eller betændelse); overfølsomhed (allergisk reaktion), ingen tegn på sår helges.
- Hvis der er varskeligt af fjernede bandager, bør den skylles med vand eller en steril saltvandopløsning.
- Sår der bærer understøttende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt (f.eks. brug af deforager kompression ved behandling av varicose eller dekompressionsforanstaltninger ved behandling av tryksår, systemiske antibiotika og hyppig overvågning ved behandling av skårntaklaget, kontrol av blod sukker med diabetes, etc.).
- En endring i bandagebehandling kan medføre øgede mængder væske, der kan nødvendiggjøre en midlertidig øget trykphed av bandaskiftet.
- Sundhedspersonale bør jævnlig undersøke bandagen for blænde infeksjoner så, diabetiske sår og sår følge av artiel insufficiens i overensstemmelse med lokale standarder.
- Produktet må kun anvendes på en patient. Når det er brugt, bør det bortskaffes på behørig vis og ikke omarbejdes eller genanvendes.
- Før påbegyndelse av behandling, er det viktig å foreta passende vurdering av sår og patient.

SKIFT OG FJERNELSE AV BANDAGE

Udførligheten tydeliggjør avhænger av patientens tilstand samt mængden af sårvede. For at fjerne en bandage med kants, skal du løse den klæbende film før du løfter bandagen fra sår.

For at fjerne en bandage uden kants, skal du forsigtigt løfte hjørnerne på bandagen væk fra sår.

Sæt ny bandage på, når XTRASORB™ skumbandage ikke kan absorbere længere eller hvis sårleingsprocessen fortsætter det.

Rengør sårfladen før en bandage påføres.

BRUGSVEJLEDNING

Før XTRASORB™ skumbandage sættes på, skal sårdrænen rengøres efter behov. Vask bandagen, der gys, at skårntakslaget helt kan dække sår samt strække ud til rundt væv (med cirka 2,5 mm, mindre ved en lille bandage).

Tag den sterile bandage ud af emballagen. Hvis det er nødvendigt kan den ikke-klæbende bandage tilskrives. Vær dog opmærksom på, at at disse kan øge risikoen for, at produktet deklamerer på sårvede sår.

For påsæten en (klæbende) bandage med kants, skal du først fjerne en del af det hvide plastlag for at afklæbe den klæbende del på bandagen. Anbring og gød på plads, mens du fjerner den anden halvdel af det hvide plastlag. Gå forsigtigt bandagen fra sår ved at løse den anden halvdel af det hvide plastlag. Gå forsigtigt rundt på bandagen fra sår, så sår, at der er god kontakt mellem den klæbende film og huden omkring sår. Når bandagen sidder fast, skal du trække materialet, der sidder på bagden af fra væk, der der sidder midt på væk på bandagen.

Ved en ikke-klæbende bandage uden kants, bør en ekstra filmbandage eller lignende bandage anvendes for at sikre, at bandagen sidder fast. Ved meget sårvede sår, skal du sørge for at fastgøre filmen flugt på bandagen kanten.

VERFORSIGT: Anvend ikke produktet, hvis produktmiljøbalen er beskadiget. Opskrift ved rumtemperatur: 10 – 25 °C. Hold tids.

OPBEVARELSE OG RENGØRING

Opbevar bandagen i et tørt miljø, der er optimalt til heling af så, det skal den styre mængden af sårvede og beskytte mod uønsket udsmelt og for eksterne bakterier. Det superabsorberende gel-lag sikrer både effektiv beskyttelse og absorpsjon.

XTRASORB™ Foam

XTRASORB™ skumbandage er en stærkt absorberende hydrofil skumbandage, produktet for bruk til behandling av sårvede sår. Skummet har et på sin overflade forlignet med patientens superabsorberende kolonneporel gel-linjal på den ene overflaten, og en integrert PU-film på baksiden. Det superabsorberende lag omvander sårvedet til et gel, absorberer og holder på væske i skårntaklaget, hvilket bevare et optimalt balanceret fugtniveau i skårntakslaget i en længere periode.

Bandagen medvirker til å skape et miljø, der er optimalt til heling av så, det skal den styre mængden av sårvede og beskytte mot uønsket utsmelt og for eksterne bakterier. Det superabsorberende gel-lag sikrer både effektiv beskyttelse og absorpsjon.

XTRASORB™ skum kan laves med eller uten klæbende kant.

INDIKASJONER

Under tilsyn av sundhedspersonale sikrer XTRASORB™ skumbandage fulgtige omgivelser for arbeiding ved å skape et miljø, der er optimalt til heling av så, det skal den styre mængden av sårvede og beskytte mot uønsket utsmelt og for eksterne bakterier. Det superabsorberende gel-lag sikrer både effektiv beskyttelse og absorpsjon.

- Diabetiske fotsår
- Bændår (venøse stasissår, arterielle sår og bændår av blandaet etiologi)
- Tryksår / sår (partielt og full tryksår)
- Tryksoår / sår (partielt og full tryksår)
- 1. og 2. grads brannår delvis tryksår
- Donorsteder og traumatisk og kirurgiske sår.

Siden bandagene kan absorbere og holde på væske under trykk, er de egnede til anvendelse under kompresjon. Bandagene kan brukes for å fughet og beskyttelse i lippet av hele leingsprosessen.

XTRASORB™ Foam-bandage kan brukes på svært væske sår. Væskemengden vil imidlertid bestemmes av den effektive bløddingsstørrelsen i bandagen, og størrelse overvåkes i forhold til dette.

XTRASORB™ Foam-bandage kan brukes på pasienter som er i behandling for en lokal eller systemisk infeksjon under veiledning av lege.

XTRASORB™ skumbandage kan på legems skin anvendes til pasienter, der modtager behandling for lokale eller systemiske infeksjoner.

KONTRAINDIKASJONER

XTRASORB™ skumbandage er ikke indikert til sår av fuld trykssår, meget blødende sår eller treghelegradsforskrændinger. Bandagen er ikke egnet til behandling av tårne sår.

FORHOLDSDREGLER OG OBSERVASJONER

Før forsiktig. Bandagene stillerl garanteres ikke, hvis asken bekræftes og åpnes for at skin anvendes. Bandagen MÅ IKKE anvendes, hvis dette er sket.