

# Carvedilol AbZ 25 mg Tabletten

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR PATIENTEN

## Carvedilol AbZ 25 mg Tabletten

Carvedilol

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

### Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Carvedilol AbZ 25 mg und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Carvedilol AbZ 25 mg beachten?
3. Wie ist Carvedilol AbZ 25 mg einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Carvedilol AbZ 25 mg aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

## 1. Was ist Carvedilol AbZ 25 mg und wofür wird es angewendet?

Carvedilol AbZ 25 mg gehört zu der Arzneimittelgruppe der Alpha- und Beta-Blocker. Carvedilol AbZ 25 mg wird zur Behandlung des Bluthochdrucks und zur Behandlung der Angina pectoris angewendet. Außerdem wird Carvedilol AbZ 25 mg als ergänzende Behandlung bei einer Herzleistungsschwäche (Herzinsuffizienz) angewendet.

## 2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Carvedilol AbZ 25 mg beachten?

Carvedilol AbZ 25 mg darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Carvedilol oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- wenn Sie eine **unbehandelte oder instabile Herzmuskelschwäche** haben oder bestimmte Arten von **Störungen im Reizleitungssystem des Herzens** (so genannter AV-Block II. und III. Grades (es sei denn, Sie haben einen Herzschrittmacher) oder Sinusknotensyndrom).
- wenn Sie an einer schweren **Lebererkrankung** leiden.
- wenn Sie einen sehr **niedrigen Puls (weniger als 50 Schläge pro Minute)** oder einen sehr **niedrigen Blutdruck** haben.
- wenn Sie an einer **schwer eingeschränkten Herzfunktion** (kardiogener Schock) leiden.
- wenn Sie an einer **schweren Störung des Säurebasenhaushalts (Übersäuerung) des Körpers** (metabolische Azidose, Azidämie) leiden.
- wenn Sie **Asthma bronchiale** oder **sonstige Atemwegserkrankungen** mit Neigung zur krampfartigen Verengung der Atemwege (z. B. chronisch obstruktive Lungenerkrankung) haben.
- wenn Sie an schweren Atemproblemen (einer akuten **Lungenembolie**) leiden.
- wenn Sie an einer ungewöhnlichen Form von Angina Pectoris (**Prinzmetal-Angina**) leiden.
- wenn Sie Herzmuskelschwäche infolge einer Erkrankung der Atemwege (Cor pulmonale) haben.
- wenn Sie an einer Überfunktion der Nebennierenrinde (**Phäochromozytom**) leiden und dies nicht medikamentös behandelt wird.
- wenn Sie mit **MAO-Hemmern** (z. B. Moclobemid) behandelt werden (Ausnahme: MAO-B-Hemmer)
- wenn Sie gleichzeitig eine intravenöse Behandlung mit **Verapamil, Diltiazem** oder anderen Arzneimitteln gegen Herzrhythmusstörungen (Antiarrhythmika) erhalten.
- wenn sie **stillen**.

### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Carvedilol AbZ 25 mg einnehmen.

# Carvedilol AbZ 25 mg Tabletten

Ihr Arzt wird **Carvedilol AbZ 25 mg** in den folgenden Situationen mit besonderer Vorsicht einsetzen

- wenn Sie eine **Herzinsuffizienz** haben und gleichzeitig
  - niedrigen Blutdruck,
  - eine **eingeschränkte Blut- und Sauerstoffversorgung des Herzens** (ischämische Herzkrankheit) und eine **Verhärtung der Arterien** (Atherosklerose) und/oder
  - **Nierenprobleme.**
 In diesen Fällen muss Ihre Nierenfunktion überwacht werden. Möglicherweise muss Ihre Dosis verringert werden.
- wenn Sie einen **Herzinfarkt** erlitten haben. Dieser muss vor der Einnahme von *Carvedilol AbZ 25 mg* ausreichend behandelt werden.
- wenn Sie eine bestimmte Art von **Störung im Reizleitungssystem des Herzens** (so genannter AV-Block I. Grades) haben.
- wenn Sie an einem **Bluthochdruck** aufgrund einer organischen Ursache leiden.
- wenn Sie eine **Zuckerkrankheit (Diabetes)** haben. Die Behandlung mit *Carvedilol AbZ 25 mg* kann die Anzeichen eines niedrigen Blutzuckers verschleiern. Deshalb muss Ihr Blutzucker regelmäßig kontrolliert werden.
- wenn Sie schwere **Durchblutungsstörungen in Händen und Füßen** haben.
- bei gleichzeitiger Behandlung mit Arzneimitteln zur Behandlung von Herzschwäche (Digitalisglykoside) oder Herzrhythmusstörungen (z. B. Verapamil, Diltiazem).
- bei niedrigem Blutdruck (orthostatischer Hypotonie).
- bei akuter entzündlicher Herzerkrankung.
- bei Verengung der Herzklappen oder des Ausflusstraktes.
- bei peripherer arterieller Gefäßerkrankung im Endstadium.
- bei labiler oder sekundärer Hypertonie.
- bei gleichzeitiger Behandlung mit bestimmten anderen Blutdruck-senkenden Arzneimitteln (Alpha<sub>1</sub>-Rezeptor-Antagonisten oder Alpha<sub>2</sub>-Rezeptor-Agonisten).
- wenn Sie an dem **Raynaud-Phänomen** (die Finger oder Zehen verfärben sich zunächst bläulich, dann weißlich und schließlich rötlich und schmerzen) leiden. *Carvedilol AbZ 25 mg* kann die Beschwerden verschlimmern.
- wenn sie eine **Überfunktion der Schilddrüse** mit vermehrter Bildung des Schilddrüsenhormons haben. *Carvedilol AbZ 25 mg* kann die Beschwerden verschleiern.
- wenn Sie *Carvedilol AbZ 25 mg* einnehmen und sich einer **Operation** unter Anwendung eines Narkosemittels unterziehen müssen. Darüber sollten Sie schon möglichst lange im Voraus mit dem für die Operation verantwortlichen Arzt sprechen.
- wenn Sie einen sehr **niedrigen Puls (weniger als 55 Schläge pro Minute)** haben.
- wenn Sie eine schwere **allergische Reaktion** hatten (z. B. auf einen Insektenstich oder ein Nahrungsmittel) oder wenn Sie gerade eine **Desensibilisierungsbehandlung** durchführen lassen oder vorhaben. *Carvedilol AbZ 25 mg* kann Ihre Empfindlichkeit gegenüber Allergenen und Ihr Risiko für schwere anaphylaktische Reaktionen erhöhen. Außerdem können Arzneimittel zur Behandlung allergischer (anaphylaktischer) Reaktionen wie Adrenalin (Epinephrin) während der Einnahme von *Carvedilol AbZ 25 mg* weniger wirksam sein.
- wenn Sie **Psoriasis** (Schuppenflechte) haben.
- schweren Hautreaktionen (z. B. toxische epidermale Nekrolyse [TEN] oder Stevens-Johnson-Syndrom [SJS]).
- wenn Sie **Kontaktlinsen** tragen. *Carvedilol AbZ 25 mg* kann die Tränenproduktion verringern.

#### Absetzerscheinungen (Entzugssyndrom)

Eine Behandlung mit *Carvedilol AbZ 25 mg* sollte nicht plötzlich abgebrochen werden. Dies gilt besonders bei Patienten mit einer Herzerkrankung aufgrund einer verminderten Durchblutung der Herzkranzgefäße. Die Dosis sollte stattdessen schrittweise über einen Zeitraum von 2 Wochen verringert werden.

#### Kinder und Jugendliche

Die Sicherheit von *Carvedilol AbZ 25 mg* bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ist nicht nachgewiesen. Die Anwendung von *Carvedilol AbZ 25 mg* bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren wird daher nicht empfohlen.

#### Ältere Patienten

Ältere Patienten können empfindlicher auf Carvedilol reagieren und sollten sorgfältiger überwacht werden.

#### Einnahme von *Carvedilol AbZ 25 mg* zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben, oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen. Andere gleichzeitig verabreichte Arzneimittel können *Carvedilol AbZ 25 mg* beeinflussen oder durch *Carvedilol AbZ 25 mg* beeinflusst werden.

# Carvedilol AbZ 25 mg Tabletten

Es ist **besonders wichtig**, dass Ihr Arzt weiß, ob Sie bereits mit folgenden Arzneimitteln behandelt werden:

- **Digoxin** oder **Digitoxin** (zur Behandlung der Herzinsuffizienz).
- **Insulin** oder **orale Antidiabetika** (blutzuckersenkende Arzneimittel), da ihre blutzuckersenkende Wirkung verstärkt und die Anzeichen eines niedrigen Blutzuckers verschleiert werden können.
- **Rifampicin** (Antibiotikum zur Behandlung der Tuberkulose).
- **Carbamazepin** (Arzneimittel zur Behandlung von Epilepsie).
- **Fluconazol** (Arzneimittel zur Behandlung von Pilzkrankungen).
- **Paroxetin, Fluoxetin, Bupropion** (Arzneimittel zur Behandlung der Depression).
- Arzneimittel, die **Reserpin, Guanethidin, Methyldopa, Guanfacin** oder **Monoaminoxidase-Hemmer** (MAO-Hemmer, Arzneimittel zur Behandlung der Depression oder Parkinson-Erkrankung) enthalten, da diese eine weitere Verlangsamung des Herzschlags hervorrufen können.
- **Ciclosporin** oder **Tacrolimus** (Arzneimittel zur Unterdrückung des Immunsystems zur Verhütung von Abstoßungsreaktionen nach einer Organtransplantation; wird auch bei bestimmten rheumatischen oder Hauterkrankungen angewendet).
- Arzneimittel zur Behandlung von unregelmäßigem Herzschlag wie z. B. **Verapamil, Diltiazem, Chinidin, Amiodaron**.
- **Clonidin** (Arzneimittel zur Senkung des Blutdrucks).
- **Sympathomimetika** (Arzneimittel, die die Funktion des sympathischen Nervensystems erhöhen: z. B. Erhöhung des Blutdrucks, der Herzfrequenz oder Erweiterung der Atemwege).
- Arzneimittel zur Behandlung von Atemproblemen (wie z. B. **Salbutamol, Formoterol**).
- **Dihydropyridine** (Arzneimittel zur Behandlung von Bluthochdruck und Herzerkrankungen)
- **Andere blutdrucksenkende Arzneimittel.** *Carvedilol AbZ 25 mg* kann die Wirkungen anderer, gleichzeitig verabreichter blutdrucksenkender Arzneimittel (z. B. **Alpha-1-Rezeptor-Antagonisten, Nitrate**) und von Arzneimitteln verstärken, bei denen die Blutdrucksenkung als eine Nebenwirkung auftritt, wie beispielsweise **Barbiturate** (zur Behandlung der Epilepsie), **Phenothiazine** (zur Behandlung von Psychosen), trizyklische **Antidepressiva** (zur Behandlung der Depression), **gefäßweiternde Arzneimittel**.
- **Muskelrelaxanzien** (Arzneimittel zur Herabsetzung der Muskelspannung).
- **Ergotamin** (Arzneimittel gegen Migräne).
- **Anästhetika** (Arzneimittel, die bei der Narkose verwendet werden).
- **Bestimmte Schmerztabletten** (NSARs = nicht-steroidale Antirheumatika), **Östrogene** (Hormone) und **kortisonhaltige Arzneimittel**, da diese in einigen Fällen die blutdrucksenkende Wirkung von *Carvedilol AbZ 25 mg* abschwächen können.
- **Cinacalcet** (Arzneimittel zur Behandlung bei Problemen mit den Nebenschilddrüsen)

## Einnahme von *Carvedilol AbZ 25 mg* zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol

Die Einnahme von *Carvedilol AbZ 25 mg* zeitgleich bzw. zeitnah mit Grapefruit oder Grapefruitsaft sollte während der Einstellung der Behandlung vermieden werden. Grapefruit und Grapefruitsaft können zu einem Anstieg des Wirkstoffs Carvedilol im Blut und nicht vorhersehbaren Nebenwirkungen führen. Der Genuss von Alkohol während der Behandlung mit *Carvedilol AbZ 25 mg* sollte eingeschränkt werden, weil Alkohol die Wirkung von *Carvedilol AbZ 25 mg* beeinflusst.

## Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Für das ungeborene Kind besteht das Risiko einer Schädigung. *Carvedilol AbZ 25 mg* darf daher während der Schwangerschaft nur eingenommen werden, wenn Ihr Arzt es für zwingend erforderlich hält. Fragen Sie deshalb immer erst Ihren Arzt um Rat, bevor Sie *Carvedilol AbZ 25 mg* während der Schwangerschaft einnehmen.

Es ist nicht bekannt, ob Carvedilol in die Muttermilch übergeht. *Carvedilol AbZ 25 mg* sollte daher nicht während der Stillzeit eingenommen werden.

## Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Bei Behandlungsbeginn, nach Dosiserhöhungen, bei Änderungen der Behandlung oder in Kombination mit Alkohol können Schwindel und Müdigkeit auftreten. Bei vorschriftsmäßiger Dosierung ist nicht bekannt, ob *Carvedilol AbZ 25 mg* einen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen hat. Wenn Sie sich nach der Einnahme der Tabletten schwindlig oder schwach fühlen, sollten Sie vermeiden, Auto zu fahren oder Arbeiten durchzuführen, die hohe Aufmerksamkeit erfordern.

# Carvedilol AbZ 25 mg Tabletten



## Auswirkungen bei Fehlgebrauch zu Dopingzwecken

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie Sportler sind und sich Doping-Tests unterziehen müssen. Die Einnahme von *Carvedilol AbZ 25 mg* kann bei Dopingkontrollen zu positiven Ergebnissen führen.

## *Carvedilol AbZ 25 mg* enthält Lactose

Bitte nehmen Sie *Carvedilol AbZ 25 mg* erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

## 3. Wie ist *Carvedilol AbZ 25 mg* einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von *Carvedilol AbZ 25 mg* zu stark oder zu schwach ist.

Sie sollten die Tabletten mit mindestens einem halben Glas Wasser schlucken. Sie können die Tabletten unabhängig von den Mahlzeiten einnehmen. Patienten mit einer Herzinsuffizienz sollten die Tabletten jedoch mit einer Mahlzeit einnehmen, um die Gefahr des Auftretens von Schwindel bei plötzlichem Aufstehen zu verringern.

Die Tablette kann in gleiche Dosen geteilt werden.

*Carvedilol AbZ* Tabletten sind in den folgenden Wirkstärken erhältlich:

12,5 mg und 25 mg.

### Bluthochdruck

#### Erwachsene

Die übliche Dosis ist einmal täglich  $\frac{1}{2}$  Tablette *Carvedilol AbZ 25 mg* (entsprechend 12,5 mg Carvedilol) für die ersten zwei Tage und danach einmal täglich 1 Tablette *Carvedilol AbZ 25 mg* (entsprechend 25 mg Carvedilol).

Falls erforderlich, kann die Dosis schrittweise in Abständen von mindestens zwei Wochen weiter erhöht werden. Die empfohlene Tageshöchstdosis beträgt 2 Tabletten *Carvedilol AbZ 25 mg* (entsprechend 50 mg Carvedilol).

#### Ältere Patienten

Die empfohlene Dosis ist einmal täglich  $\frac{1}{2}$  Tablette *Carvedilol AbZ 25 mg* (entsprechend 12,5 mg Carvedilol).

Falls erforderlich, kann die Dosis schrittweise in Abständen von mindestens zwei Wochen auf die Tageshöchstdosis von 2 Tabletten *Carvedilol AbZ 25 mg* (entsprechend 50 mg Carvedilol) pro Tag erhöht werden.

### Angina pectoris

#### Erwachsene

Die übliche Dosis ist zweimal täglich  $\frac{1}{2}$  Tablette *Carvedilol AbZ 25 mg* (entsprechend zweimal täglich 12,5 mg Carvedilol) für die ersten zwei Tage und danach zweimal täglich 1 Tablette *Carvedilol AbZ 25 mg* (entsprechend zweimal täglich 25 mg Carvedilol).

Falls erforderlich, kann die Dosis schrittweise in Abständen von mindestens 2 Wochen weiter erhöht werden. Die empfohlene Tageshöchstdosis beträgt 4 Tabletten *Carvedilol AbZ 25 mg* (entsprechend 100 mg Carvedilol pro Tag).

#### Ältere Patienten

Die übliche Dosis ist zweimal täglich  $\frac{1}{2}$  Tablette *Carvedilol AbZ 25 mg* (entsprechend zweimal täglich 12,5 mg Carvedilol) für die ersten zwei Tage und danach zweimal täglich 1 Tablette *Carvedilol AbZ 25 mg* (entsprechend zweimal täglich 25 mg Carvedilol). Die empfohlene Tageshöchstdosis beträgt 2 Tabletten *Carvedilol AbZ 25 mg* (entsprechend 50 mg Carvedilol) pro Tag.

### Herzinsuffizienz

Die übliche Anfangsdosis ist zweimal täglich 3,125 mg Carvedilol für zwei Wochen. Für diese Dosierung stehen andere Dosisstärken zur Verfügung. Die Dosis kann schrittweise, im Allgemeinen in zweiwöchentlichen Abständen, gesteigert werden.

# Carvedilol AbZ 25 mg Tabletten



Die Dosis muss jedoch möglicherweise erhöht oder verringert werden. Ihr Arzt wird Sie entsprechend beraten. Die empfohlene Tageshöchstdosis beträgt 25 mg zweimal täglich für Patienten mit einem Körpergewicht unter 85 kg und 50 mg zweimal täglich für Patienten mit einem Körpergewicht über 85 kg, vorausgesetzt, es handelt sich nicht um eine schwere Herzinsuffizienz. Eine Dosiserhöhung auf 50 mg zweimal täglich sollte vorsichtig unter engmaschiger ärztlicher Überwachung erfolgen.

## Wenn Sie eine größere Menge von Carvedilol AbZ 25 mg eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge von Carvedilol AbZ 25 mg eingenommen haben, als Sie sollten, oder wenn Kinder versehentlich das Arzneimittel eingenommen haben, nehmen Sie bitte mit Ihrem Arzt oder dem Krankenhaus Kontakt auf oder rufen Sie den Notfalldienst an, um sich über das Risiko zu informieren und sich beraten zu lassen, was Sie tun müssen.

Zu den Anzeichen einer Überdosierung können wegen des extrem niedrigen Blutdrucks das Gefühl des Ohnmächtig werdens sowie langsamer Herzschlag und in schweren Fällen gelegentlich ausbleibende Herzschläge zählen. Atembeschwerden, verengte Atemwege, Unwohlsein, Bewusstseinsstrübung und Krampfanfälle können ebenfalls auftreten.

## Wenn Sie die Einnahme von Carvedilol AbZ 25 mg vergessen haben

Wenn Sie die Einnahme einer Dosis (oder mehrerer Dosen) vergessen haben, nehmen Sie die nächste Dosis wieder zu Ihrem üblichen Zeitpunkt der Einnahme ein. Nehmen Sie nicht die doppelte (oder eine größere) Dosis ein, wenn Sie die vorherige(n) Einnahme(n) vergessen haben.

## Wenn Sie die Einnahme von Carvedilol AbZ 25 mg abbrechen

Brechen Sie Ihre Behandlung nicht plötzlich ab und verändern Sie nicht die Dosis, wenn Ihr Arzt dies nicht angewiesen hat. Ihre Behandlung muss schrittweise über einen Zeitraum von zwei Wochen ausgeschlichen werden. Ein plötzlicher Abbruch der Behandlung kann Ihre Beschwerden verschlimmern.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

## 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Die Mehrzahl der Nebenwirkungen ist dosisabhängig und geht zurück, wenn die Dosis verringert oder die Behandlung beendet wird. Einige Nebenwirkungen können bei Behandlungsbeginn auftreten und während des Verlaufs der Behandlung wieder spontan verschwinden.

*Sehr häufig (kann mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen)*

- Schwindel
- Kopfschmerzen
- Herzmuskelschwäche
- Niedriger Blutdruck
- Kraftlosigkeit

*Häufig (kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen)*

- Bronchitis, Lungenentzündung, Infektionen der oberen Atemwege
- Harnwegsinfekte
- Verringerte Anzahl roter Blutkörperchen (Anämie)
- Gewichtszunahme
- Erhöhte Cholesterinspiegel
- Mangelnde Blutzuckerkontrolle bei Diabetikern
- Depression, depressive Verstimmung
- Sehstörungen
- Verringerte Tränensekretion, Augenreizung
- Langsamer Herzschlag
- Ödeme (Schwellungen des Körpers oder von Körperteilen), Flüssigkeitsüberlastung, erhöhtes Blutvolumen
- Schwindel bei schnellem Aufstehen
- Ohnmacht

# Carvedilol AbZ 25 mg Tabletten

- Durchblutungsstörungen (Anzeichen sind kalte Hände und Füße), Verhärtung der Arterien (Atherosklerose) Verschlechterung der Beschwerden bei Patienten mit Raynaud-Krankheit (die Finger oder Zehen verfärben sich zunächst bläulich, dann weißlich und schließlich rötlich und schmerzen) oder mit Claudicatio intermittens (Schmerzen in den Beinen, die beim Gehen schlimmer werden)
- Asthma und Atembeschwerden
- Flüssigkeitsansammlung in den Lungen
- Durchfall
- Unwohlsein, Übelkeit, Erbrechen, Magenschmerzen, Verdauungsstörungen
- Schmerzen (z. B. in Armen und Beinen)
- Akute Niereninsuffizienz und Nierenfunktionsstörungen bei Patienten mit Arterienverhärtung (Atherosklerose) und/oder eingeschränkter Nierenfunktion
- Schwierigkeiten beim Wasserlassen

*Gelegentlich (kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen)*

- Schlafstörungen
- Verwirrtheit, Halluzinationen
- Alpträume
- Empfindungsstörungen
- Störungen im Reizleitungssystem des Herzens, Angina pectoris (mit Schmerzen in der Brust)
- Bestimmte Hautreaktionen (z. B. allergische Hautentzündung, Quaddeln, Juckreiz und entzündliche Hauterscheinungen, vermehrtes Schwitzen, schuppenflechten- oder knötchenflechtenartige Hautveränderungen).
- Verstopfung
- Impotenz

*Selten (kann bis zu 1 von 1.000 Behandelten betreffen)*

- Verringerte Anzahl von Blutplättchen (Thrombozytopenie)
- Verstopfte Nase
- Mundtrockenheit

*Sehr selten (kann bis zu 1 von 10.000 Behandelten betreffen, einschließlich Einzelfälle)*

- Geringe Anzahl weißer Blutkörperchen (Leukopenie)
- Psychosen
- Allergische Reaktionen
- Schwere Hautreaktionen einschließlich Blasenbildung, rote oder violette Flecken oder Abschälen der Haut. Es kann auch den Mund, die Augen und andere Schleimhäute betreffen. (Stevens-Johnson-Syndrom, toxische epidermale Nekrolyse oder Erythema multiforme)
- Veränderte Leberwerte
- Blasenschwäche (Harninkontinenz) bei Frauen

*Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)*

- Haarausfall

Die Klasse der Beta-Rezeptorenblocker kann eine verborgene Zuckerkrankheit erkennbar werden lassen.

Es kann zu übermäßigem Schwitzen kommen (Hyperhidrosis).

## Meldungen von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## 5. Wie ist Carvedilol AbZ 25 mg aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

# Carvedilol AbZ 25 mg Tabletten



Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton, dem Etikett und/oder den Blisterpackungen nach „Verwendbar bis“/„Verw. bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Für dieses Arzneimittel sind bezüglich der Temperatur keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z. B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter [www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung](http://www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung).

## 6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### Was Carvedilol AbZ 25 mg enthält

- Der Wirkstoff ist Carvedilol.  
Jede Tablette enthält 25 mg Carvedilol.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Mikrokristalline Cellulose, Lactose-Monohydrat, Crospovidon (Typ A) (Ph.Eur.), Povidon K30, Hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat (Ph.Eur.).

### Wie Carvedilol AbZ 25 mg aussieht und Inhalt der Packung

Weißer, beidseitig gewölbte, kapselförmige Tablette mit einer Bruchkerbe und der Prägung „C“ und „4“ auf der einen Seite und glatt auf der anderen Seite.

Carvedilol AbZ 25 mg ist in Packungen mit 50 und 100 Tabletten erhältlich.

### Pharmazeutischer Unternehmer

AbZ-Pharma GmbH  
Graf-Arco-Str. 3  
89079 Ulm

### Hersteller

Merckle GmbH  
Ludwig-Merckle-Str. 3  
89143 Blaubeuren

oder

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company  
- Teva Gyógyszergyár Zrt. –  
Pallagi út 13  
4042 DEBRECEN  
UNGARN

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:

Deutschland	Carvedilol AbZ 25 mg Tabletten
Schweden	Carvsanna 25 mg tabletter

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2025.

### Weitere Informationsquellen

Die aktuell genehmigten Informationen (Produktinformationstexte) zu diesem Arzneimittel sind durch Scannen des in der Packungsbeilage abgebildeten QR-Codes mit einem Smartphone/Lesegerät verfügbar. Dieselben Informationen sind auch unter der folgenden URL verfügbar:

<http://www.patienteninfo-abz.de/key-FIESXL92H1J8.html>

# Carvedilol AbZ 25 mg Tabletten



Versionscode: Z08