

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

WICK AngiMed Zitronengeschmack 2 mg/ml + 0,5 mg/ml Spray zur Anwendung in der Mundhöhle, Lösung

Chlorhexidinbis(D-gluconat)/Lidocainhydrochlorid-Monohydrat

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder sogar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist WICK AngiMed Zitronengeschmack und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von WICK AngiMed Zitronengeschmack beachten?
3. Wie ist WICK AngiMed Zitronengeschmack anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist WICK AngiMed Zitronengeschmack aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist WICK AngiMed Zitronengeschmack und wofür wird es angewendet?

WICK AngiMed Zitronengeschmack enthält die Wirkstoffe Chlorhexidinbis(D-gluconat) und Lidocainhydrochlorid-Monohydrat. Es ist ein Arzneimittel für den Hals und kombiniert ein Antiseptikum (tötet Mikroorganismen) mit einem Anästhetikum (schmerzstillend).

WICK AngiMed Zitronengeschmack wird bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren zur Behandlung der Symptome von Halsschmerzen angewendet.

Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von WICK AngiMed Zitronengeschmack beachten?

WICK AngiMed Zitronengeschmack darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Chlorhexidin, Lidocain, andere Lidocain-ähnliche Lokalanästhetika oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- bei Kindern unter 6 Jahren.
- wenn Sie alkoholabhängig sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie WICK AngiMed Zitronengeschmack anwenden,

- wenn Sie an kongestiver Herzinsuffizienz leiden.
- wenn Ihre Leber nicht richtig arbeitet.
- wenn Sie Arzneimittel zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen (Antiarrhythmika) einnehmen.
- wenn Sie schon einmal schwere allergische Reaktionen hatten.

Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker, wenn sich Ihr Zustand unter der Anwendung von WICK AngiMed Zitronengeschmack nicht nach 3 Behandlungstagen bessert oder wenn Sie hohes Fieber haben.

Achten Sie darauf, dass die Lösung nicht an oder in die Augen oder Ohren gelangt. Wenn die Lösung in die Augen gelangt, müssen Sie diese mindestens 15 Minuten lang mit sauberem Wasser spülen. Während der Spülung sollen die Augenlider offen sein.

WICK AngiMed Zitronengeschmack soll nicht weniger als 30 Minuten vor oder während dem Essen oder Trinken angewendet werden, denn die Betäubung von Rachen und Zunge führt zu einem Risiko sich zu verschlucken und von lokaler Verbrennung durch heißes Essen/Trinken.

Dieses Arzneimittel ist nicht mit bestimmten Stoffen kompatibel, die oft in Zahnpasta enthalten sind. Deshalb müssen Sie nach dem Zähneputzen mindestens eine halbe Stunde warten, bevor Sie dieses Arzneimittel anwenden.

Bei Patienten mit beschädigter Schleimhaut im Rachen soll das Arzneimittel mit Vorsicht angewendet werden.

Kinder

WICK AngiMed Zitronengeschmack darf bei Kindern unter 6 Jahren nicht angewendet werden.

Anwendung von WICK AngiMed Zitronengeschmack zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel anzuwenden.

Weil WICK AngiMed Zitronengeschmack Lidocain enthält, teilen Sie bitte insbesondere mit, wenn Sie Folgendes einnehmen:

- Neuromuskuläre Inhibitoren (z. B. während einer Anästhesie)
- Arzneimittel zur Behandlung von Epilepsie (Hydantoine)
- Ein Medikament zur Behandlung plötzlicher, schwerer allergischer Reaktionen (Epinephrin)
- Starke Schmerzmittel (Opiate)
- Betablocker (verwendet bei Bluthochdruck und bestimmten Herzerkrankungen)
- Cimetidin (ein Arzneimittel, das die Magensäuremenge reduziert, z. B. bei Sodbrennen)
- Mexiletin und andere Antiarrhythmika.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Falls notwendig, kann eine Anwendung von WICK AngiMed Zitronengeschmack während der Schwangerschaft oder Stillzeit in Betracht gezogen werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Dieses Arzneimittel hat keinen oder einen zu vernachlässigenden Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

WICK AngiMed Zitronengeschmack enthält Alkohol (Ethanol) und Propylenglycol.

Dieses Arzneimittel enthält 100 mg Alkohol (Ethanol) pro Dosis von 5 Sprühstößen (Jugendliche über 12 Jahren und Erwachsene) bzw. 60 mg Alkohol (Ethanol) pro Dosis von 3 Sprühstößen (Kinder von 6 bis 12 Jahren). Die Menge pro Dosis dieses Arzneimittels entspricht (bei Jugendlichen ab 12 Jahren und Erwachsenen) weniger als 2,5 ml Bier oder 1,0 ml Wein bzw. (bei Kindern von 6 bis 12 Jahren) weniger als 1,6 ml Bier oder 0,6 ml Wein. Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.

Dieses Arzneimittel enthält 85 mg Propylenglycol pro Dosis von 5 Sprühstößen (Jugendliche über 12 Jahren und Erwachsene) bzw. 51 mg Propylenglycol pro Dosis von 3 Sprühstößen (Kinder von 6 bis 12 Jahren).

3. Wie ist WICK AngiMed Zitronengeschmack anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Erwachsene und Jugendliche über 12 Jahren:

Die empfohlene Dosis beträgt 3 – 5 Sprühstöße pro Anwendung, 6- bis 10-mal pro Tag.

Die höchste Einzeldosis beträgt 5 Sprühstöße.

Die Tageshöchstdosis beträgt 50 Sprühstöße.

Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren

Die empfohlene Dosis beträgt 2 – 3 Sprühstöße pro Anwendung, 3- bis 5-mal pro Tag.

Die höchste Einzeldosis beträgt 3 Sprühstöße.

Die Tageshöchstdosis beträgt 15 Sprühstöße.

Der Abstand zwischen zwei Anwendungen darf nicht weniger als 4 Stunden betragen.

Kinder unter 6 Jahren

Dieses Arzneimittel darf Kindern unter 6 Jahren nicht verabreicht werden.


Art der Anwendung

Zur Anwendung in der Mundhöhle.

WICK AngiMed Zitronengeschmack soll nicht weniger als 30 Minuten vor oder während dem Essen oder Trinken angewendet werden, denn die Betäubung von Rachen und Zunge führt zu einem Risiko sich zu verschlucken und von lokaler Verbrennung durch heißes Essen/Trinken.

Dieses Arzneimittel ist nicht kompatibel mit einigen Substanzen, die häufig in Zahnpasta enthalten sind. Daher müssen Sie nach dem Zähneputzen mindestens eine halbe Stunde warten, bevor Sie dieses Arzneimittel anwenden.

Eine Flasche sollte nur von einem Patienten verwendet werden.



1. Drehen Sie vor Gebrauch das Sprühröhrchen nach oben, sodass es rechtwinklig zur Flasche steht.
2. Öffnen Sie den Mund weit, richten Sie das Sprühröhrchen auf den Rachen und drücken Sie den Sprühkopf. Halten Sie während des Sprühens den Atem an.

Bei der ersten Anwendung muss die Pumpe so oft betätigt werden, bis nur noch Flüssigkeit austritt (in der Regel 6 – 7-mal). Dies kann auch notwendig sein, wenn das Arzneimittel längere Zeit nicht verwendet wurde.

Wenn Sie das Arzneimittel eine Zeitlang nicht verwenden, empfiehlt es sich, den Zerstäuber nach der letzten Anwendung gemäß dem folgenden Verfahren zu reinigen:

- Drehen Sie die Sprühflasche um und drücken Sie den Sprühkopf, bis keine Flüssigkeit mehr austritt (keine Lösung mehr aus dem Zerstäuber kommt).
- Entfernen Sie den Zerstäuber aus dem Sprühkopf und legen Sie ihn einige Minuten in eine Schale mit warmem Wasser.
- Nehmen Sie den Zerstäuber aus dem Wasser und lassen Sie ihn trocknen.
- Setzen Sie den trockenen Zerstäuber auf den Sprühkopf, indem Sie ihn nach unten drehen, sodass er den Sprühkopf blockiert.

Behandlungsdauer

WICK AngiMed Zitronengeschmack darf nicht länger als an drei aufeinanderfolgenden Tagen angewendet werden.

Fragen Sie Ihren Arzt um Rat, wenn Sie sich unter der Anwendung von WICK AngiMed Zitronengeschmack nicht besser, oder sogar schlechter fühlen oder wenn Sie hohes Fieber haben.

Wenn Sie eine größere Menge von WICK AngiMed Zitronengeschmack angewendet haben, als Sie sollten

Überdosen (mehr als eine Flasche pro Tag) können zu Schluckbeschwerden (verminderter Schluckreflex) führen.

Weitere Symptome einer Überdosierung von Chlorhexidin sind: Schwellung der Atemwege, Erbrechen, extremes Hochgefühl (Euphorie), verschwommenes Sehen und Geschmacksverlust (kann mehrere Stunden anhalten), Speiseröhren-, Magen- und/oder Zwölffingerdarmgeschwür, erhöhte Konzentrationen von Leberenzymen (die nur mittels Bluttests nachweisbar sind).

Weitere Symptome einer Überdosierung von Lidocain sind: Kopfschmerzen, Paranoia, Halluzinationen, Schwindelgefühl, Vertigo, Schläfrigkeit, Unruhe, Ohrensausen, unangenehmes Gefühl auf der Haut (z. B. Prickeln, Kribbeln), Sprach- oder Hörstörung, metallischer Geschmack,

Taubheit um den Mund, Azidose (mit Symptomen wie schnelle Atmung, Verwirrtheit, Müdigkeit), verschwommenes Sehen, unwillkürliche rhythmische Augenbewegungen, Muskelzucken, Psychosen, Krämpfe, Atemstillstand, epileptisches Koma, Bewusstseinstörung, plötzlicher Blutdruckabfall, langsamer Herzschlag, Herzrhythmusstörungen und Herzstillstand.

Wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eines dieser Symptome bei Ihnen (oder Ihrem Kind) auftritt.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Wenn eines der folgenden Symptome bei Ihnen auftritt, beenden Sie die Anwendung des Arzneimittels und wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt oder suchen Sie die Notaufnahme des nächstgelegenen Krankenhauses auf:

- Schwere allergische Reaktionen (selten, kann bis zu 1 von 1 000 Behandelten betreffen), können sich äußern durch z. B.
 - Schwellung von Armen, Beinen, Knöcheln, Gesicht oder Augen
 - Schwellung von Lippen, Mund, Zunge oder Rachen, die Schluck- oder Atembeschwerden hervorrufen können
 - Schwindelgefühle oder Ohnmacht (Bewusstlosigkeit)
- Juckender, erhabener Hautausschlag, der sich über den ganzen Körper ausbreitet (Nesselsucht) (sehr selten, kann bis zu 1 von 10 000 Behandelten betreffen).

Andere mögliche Nebenwirkungen

Häufig (kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen)

- Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen
- Allergische Hautreaktionen

Selten (kann bis zu 1 von 1 000 Behandelten betreffen)

- Örtlich begrenzter juckender Hautausschlag nach Kontakt mit dem Arzneimittel

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)

- Mangel oder Verlust von Kraft und Energie und Blutveränderungen mit Symptomen wie Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Atembeschwerden und bläulicher Haut (Methämoglobinämie)
- Empfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht (verzögert) oder andere Reaktionen auf der Haut oder den Zähnen
- Angst, Unruhe, extremes Hochgefühl (Euphorie)
- Schläfrigkeit, Vertigo, schlechte Orientierung, Verwirrtheit (auch verwirrte Sprache), Schwindelgefühl, Zittern, Psychose, Nervosität, Kribbeln, Taubheit, Krämpfe, Bewusstlosigkeit, Koma
- Sehstörungen (verschwommenes Sehen oder Doppelsehen)
- Ohrgeräusche (Tinnitus)
- Asthma, Atemprobleme (Dyspnoe), schnelles und flaches Atmen, das zu Schwindel und bläulicher Haut führt (Atemnot und -depression), plötzliche Atemunfähigkeit (Atemstillstand)
- Schluckprobleme, Aphten
- Hautablösung im Mund, Schwellung der Speicheldrüsen

- Muskelzucken oder -zittern (Tremor)
- Allgemeine Schwäche und Energiemangel (Asthenie), vorübergehende Geschmacksstörungen oder ein brennendes Gefühl auf der Zunge, kalte oder heiße Empfindungen im Mund.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist WICK AngiMed Zitronengeschmack aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Flasche/dem Umkarton nach „Verw. bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nicht über 25 °C lagern.

Die Dauer der Haltbarkeit nach Anbruch beträgt 6 Monate.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was WICK AngiMed Zitronengeschmack enthält

- Die Wirkstoffe sind Chlorhexidinbis(D-gluconat) und Lidocainhydrochlorid-Monohydrat. Ein ml Lösung enthält 2 mg Chlorhexidinbis(D-gluconat) (entsprechend 1,15 mg Chlorhexidin) und 0,5 mg Lidocainhydrochlorid-Monohydrat (entsprechend 0,41 mg Lidocain). Jeder Sprühstoß (85 Mikroliter) enthält 0,17 mg Chlorhexidinbis(D-gluconat) und 0,04 mg Lidocainhydrochlorid-Monohydrat.
- Die sonstigen Bestandteile sind:
Zitronen-Aroma, flüssig, CRA 158-5 L, Carlos Cramer S.A.C.I. (enthält Ethanol);
Glycerol (E 422), Propylenglycol (E 1520), Sucralose (E 955), Citronensäure-Monohydrat (E 330), Ethanol 96 %, gereinigtes Wasser.

Wie WICK AngiMed Zitronengeschmack aussieht und Inhalt der Packung

WICK AngiMed Zitronengeschmack Spray zur Anwendung in der Mundhöhle, Lösung, ist eine klare, farblose Lösung. Sie ist erhältlich in einer braunen Glasflasche zu 30 ml mit Sprühpumpe aus Polypropylen, Polyethylen, Polyoxyethylen und Edelstahl. Jede Packung enthält eine Flasche.

Pharmazeutischer Unternehmer

WICK Pharma
Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH

Sulzbacher Str. 40
65824 Schwalbach am Taunus
Deutschland

Hersteller

Laboratoria Qualiphar NV
Rijksweg 9
2880 BORNEM
Belgien

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:

Frankreich	VORJA CITRON 2 mg/0,5 mg par mL, solution pour pulvérisation buccale édulcorée au sucralose
Italien	VICKS GOLA Limone, 2/0,5 mg/mL spray oromucosale, soluzione
Niederlande	Oraliv citroen suikervrij 2 mg/ml + 0,5 mg/ml spray voor oromucosaal gebruik, oplossing
Spanien	AngiStop 2 mg/ml + 0,5 mg/ml solución para pulverización bucal sabor limón

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Januar 2026.