



PARAM – Desinfektionstücher Hände & Fläche Lotion 2 in 1

Produktbeschreibung	Gebrauchsfertige, alkoholfreie Tücher für die hygienische Hände- und Flächendesinfektion.																						
Anwendung	Händedesinfektion: Vor der Desinfektion stark verschmutzte Hände reinigen. Zur Händedesinfektion die trockenen Hände mit dem feuchten Tuch benetzen und über die gesamte Einwirkzeit feucht halten, gegebenenfalls ein weiteres Tuch verwenden. Flächendesinfektion: Vor der Desinfektion stark verschmutzte Flächen reinigen. Zur Flächendesinfektion die Fläche vollständig benetzen und gegebenenfalls mit einem zweiten Tuch nachwischen. Die Fläche muss während der gesamten Einwirkzeit feucht gehalten werden. Die Einwirkzeiten beachten.																						
Auszeichnungen	ALKOHOLFREI BEGRENZT VIRUZID																						
Ausführungen	<table><tr><th>Artikelbeschreibung</th><th>Größe</th><th>Inhalt</th><th>Artikelnummer</th><th>GTIN</th><th>PZN</th><th>VE</th></tr><tr><td>Desinfektionstücher</td><td>18 cm × 20 cm</td><td>60 Blatt</td><td>79817</td><td>4046153143214</td><td>19139611</td><td>16</td></tr></table>							Artikelbeschreibung	Größe	Inhalt	Artikelnummer	GTIN	PZN	VE	Desinfektionstücher	18 cm × 20 cm	60 Blatt	79817	4046153143214	19139611	16		
Artikelbeschreibung	Größe	Inhalt	Artikelnummer	GTIN	PZN	VE																	
Desinfektionstücher	18 cm × 20 cm	60 Blatt	79817	4046153143214	19139611	16																	
Einwirkzeiten	<table><tr><th>Wirksamkeit</th><th>Belastung</th><th>Normen</th><th>Einwirkzeiten</th></tr><tr><td>Bakterizid</td><td>niedrige Belastung</td><td>EN 13727*, EN 16615</td><td>1 Minute</td></tr><tr><td>Levurozid</td><td>niedrige Belastung</td><td>EN 13624*, EN 16615</td><td>1 Minute</td></tr><tr><td>Begrenzt viruzid (Modified Vaccinia Ankara)</td><td>niedrige Belastung</td><td>EN 14476*</td><td>1 Minute</td></tr></table> *getestet an Tränklösung							Wirksamkeit	Belastung	Normen	Einwirkzeiten	Bakterizid	niedrige Belastung	EN 13727*, EN 16615	1 Minute	Levurozid	niedrige Belastung	EN 13624*, EN 16615	1 Minute	Begrenzt viruzid (Modified Vaccinia Ankara)	niedrige Belastung	EN 14476*	1 Minute
Wirksamkeit	Belastung	Normen	Einwirkzeiten																				
Bakterizid	niedrige Belastung	EN 13727*, EN 16615	1 Minute																				
Levurozid	niedrige Belastung	EN 13624*, EN 16615	1 Minute																				
Begrenzt viruzid (Modified Vaccinia Ankara)	niedrige Belastung	EN 14476*	1 Minute																				
Zusammensetzung	In 100 g Tränklösung sind als Wirkstoffe enthalten: 0,8 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 0,5 g 2-Phenoxyethanol.																						
Chemisch-physikalische Daten	<table><tr><th>Dichte</th><th>Aussehen</th><th>Flammpunkt</th><th>pH-Wert</th><th>Viskosität</th></tr><tr><td>0,9–1,1 g/cm³</td><td>getränkte Tücher mit farbloser Flüssigkeit</td><td>>60°C</td><td>5–6,5</td><td>nicht verfügbar</td></tr></table>							Dichte	Aussehen	Flammpunkt	pH-Wert	Viskosität	0,9–1,1 g/cm³	getränkte Tücher mit farbloser Flüssigkeit	>60°C	5–6,5	nicht verfügbar						
Dichte	Aussehen	Flammpunkt	pH-Wert	Viskosität																			
0,9–1,1 g/cm³	getränkte Tücher mit farbloser Flüssigkeit	>60°C	5–6,5	nicht verfügbar																			
Kennzeichnung gemäß CLP-Verordnung	Es sind zusätzliche Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung (EU) 528/2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten zu beachten.																						
Qualitätssicherung	Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. BAuA-Registrierungsnummer: N-120760																						
Verwendbarkeit	2 Jahre / 28 Tage nach Anbruch																						
Symbole																							