

Beratungshotline 0800 100 833 6
(kostenlos) www.novalac.de

ANWENDUNG **Novalac BK** ist eine Spezialnahrung von Geburt an, die speziell auf die Ernährungsbedürfnisse von Säuglingen mit Blähungen und Koliken abgestimmt ist, wenn nicht oder teilweise gestillt wird. **Novalac BK** hilft auf natürliche Weise bei ernährungsbedingten Verdauungsbeschwerden, wenn ein Säugling zu Blähungen (Darmgase) und Koliken neigt. **Novalac BK** hat einen reduzierten Lactosegehalt (Milchzucker-gehalt).

DOSIERUNG

Alter (Monate)	0–1	1–2	2–4	4–6	6–12	12–36
Anzahl Fläschchen pro Tag	6	5	5	4	3*	2*
Anzahl Messlöffel	3	4	5	7	7	8
Abgekochtes Wasser (ml)	90	120	150	210	210	240

* als Teil einer abwechslungsreichen Ernährung

Standardauflösung: 13 g Pulver + 90 ml abgekochtes Trinkwasser = 100 ml trinkfertige Nahrung.
1 gestrichener Messlöffel entspricht ca. 4,3 g **Novalac BK**

Nach Absprache mit Ihrem Kinderarzt sollen Mengen und Anzahl aller Tagesmahlzeiten auf die Bedürfnisse Ihres Babys abgestimmt werden. Bitte halten Sie die Dosierungsempfehlungen genau ein.

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) zum Diätmanagement bei Blähungen und Koliken.

WICHTIGE HINWEISE Muttermilch ist die beste Ernährung für Ihr Baby! **Novalac BK** ist von Geburt an zur ausschließlichen und ergänzenden Ernährung von Säuglingen geeignet, wenn nicht oder nur teilweise gestillt wird. Ab dem 6. Monat sollte **Novalac BK** in Absprache mit Ihrem Kinderarzt mit Beikostzeiten kombiniert werden. **Novalac BK** nicht anwenden bei Kuhmilchproteinallergie, Frühgeburt, geringem Geburtsgewicht oder bei Säuglingen mit geschwächtem Immunsystem. Die Proteinquelle in **Novalac BK** ist Kuhmilch. Das Produkt ist nicht für die parenterale Ernährung sowie zur Sondenernährung geeignet. Bitte wenden Sie **Novalac BK** nur unter ärztlicher Kontrolle an.

SICHERHEITSHINWEISE

- Mindestens haltbar bis: siehe Bodenaufdruck der Dose.
- Beim ersten Öffnen Metallfolie komplett entfernen.
- Nach Öffnen der Dose innerhalb von max. 3 Wochen aufbrauchen.
- Dose nach Gebrauch gut mit dem Plastikdeckel verschließen, trocken und kühl aufbewahren.
- Ein zu langes und häufiges Nuckeln bei der Gabe der Flaschennahrung vermeiden, um Karies zu verhindern.
- Putzen Sie die Zähne Ihres Babys immer nach der letzten Flasche.
- Flasche immer direkt vor dem Füttern zubereiten und nicht vorbereiten.
- Flasche innerhalb 1 Stunde nach Zubereitung verbrauchen und Reste nicht wieder aufwärmen, sondern verwerfen.
- Keinen Zucker hinzufügen.
- Nicht geeignet zur Sondenernährung.
- Nicht zur parenteralen Verwendung geeignet.
- **Novalac BK** nicht bei Galactosämie geben.

e 800 g

20E0S08B ET1550800 3621690



PZN - 20005695

Unter Schutzatmosphäre verpackt. Die Dose, der Messlöffel sowie der Plastikdeckel können recycelt werden.

Hergestellt von **Laboratoires Novalac SA, Genf**



Vertrieb durch **Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG**, Herzbergstraße 3,
D-61138 Niederdorfelden, www.novalac.de

Novalac BK



Zum Diätmanagement
bei Blähungen und Koliken

Spezialnahrung
0–36 Monate

800 g

NÄHRWERTE

	im Durchschnitt	100g Pulver	100ml trinkfertige Nahrung
Energie			
	kJ	2095	272
	kcal	500	65
Fett			
davon	g	25	3,3
- gesättigte Fettsäuren	g	10,5	1,4
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren	g	5,1	0,7
davon			
- Linolensäure	mg	4500	600
- Alpha Linolensäure	mg	405	53
- DHA (Docosahexaensäure)	mg	120	16
- ARA (Arachidonsäure)	mg	30	4
Kohlenhydrate	g	57,5	7,5
davon			
- Zucker	g	22	2,9
davon			
- Lactose	g	18	2,3
Ballaststoffe	g	1,2	0,2
Eiweiß*	g	10,4	1,4
Salz	g	0,475	0,06
Vitamine			
Vitamin A	µg	440	57
Vitamin D	µg	12	1,6
Vitamin K	µg	70	9,1
Vitamin C	mg	70	9,1
Thiamin	mg	0,9	0,12
Riboflavin	mg	1,2	0,2
Vitamin B6	mg	0,5	0,07
Niacin	mg	5	0,7
Folsäure	µg	85	11
Vitamin B12	µg	1,6	0,2
Pantothenensäure	mg	5	0,7
Biotin	µg	24	3,1
Vitamin E	mg	11	1,4
Mineralstoffe			
Natrium	mg	190	25
Chlorid	mg	400	52
Kalium	mg	590	77
Calcium	mg	500	65
Phosphor	mg	310	40
Magnesium	mg	40	5,2
Eisen	mg	5	0,7
Zink	mg	3,5	0,5
Kupfer	mg	0,38	0,05
Jod	µg	95	12
Selen	µg	26	3,4
Mangan	mg	0,035	0,005
Chrom	µg	<45	<5,9
Molybdän	µg	<45	<5,9
Fluorid	mg	<0,45	<0,06

NÄHRWERTE

	im Durchschnitt	100g Pulver	100ml trinkfertige Nahrung
Weitere Inhaltsstoffe			
Cholin	mg	170	22
Inositol	mg	80	10,4
Taurin	mg	40	5,2
L-Carnitin	mg	20	2,6
GOS (Galacto-Oligosaccharide)	g	1,85	0,2

*Proteinquelle ist Kuhmilch

ZUTATEN **Magermilch**, Maltodextrin, Pflanzliche Öle (Palm-, Soja-, Kokosnuss-, Rapsöl), Galacto-Oligosaccharide (**Milch**), Lactose (**Milch**), **Fischöl** (DHA), Tricalciumcitrat, Cholinbitartrat, Emulgator (Lecithin (**Soja**)), Tricalciumcitrat, Dinatriumphosphat, Vitamine (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, Biotin, Folsäure, Niacin, Pantothenensäure), Natriumchlorid, Trimagnesiumcitrat, Eisenpyrophosphat, Inositol, L-Cystin, L-Tryptophan, Milchkulturen (Bifidobacterium Lactis, Lactobacillus Rhamnosus GG), Kaliumchlorid, Taurin, Mortierella alpina Öl (ARA), Calciumhydroxid, Dikaliumphosphat, L-Carnitin, Magnesiumchlorid, Zinksulfat, Antioxidationsmittel (stark tocopherolhaltige Extrakte, Ascorbylpalmitat), Natriumselenit, Kaliumjodid, Kupfersulfat, Mangansulfat.

ZUBEREITUNG Für die Gesundheit Ihres Babys ist es wichtig, die Hinweise zur hygienischen Zubereitung genau zu beachten. Unsachgemäße Zubereitung und Lagerung kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.



Vor der Zubereitung gründlich Hände waschen. Bereiten Sie jede Flasche frisch zu. Flasche und Sauger reinigen und 10 Minuten in kochendem Wasser sterilisieren. Frisches Leitungswasser 5 Minuten lang abkochen und auf 40 °C abkühlen. Oder kohlenensäurearmes Mineralwasser auf maximal 40 °C erwärmen. Erforderliche Wassermenge in die Flasche füllen.



Entsprechende Anzahl gestrichener – nicht gehäufte – Messlöffel Novalac hinzugeben. Bitte ausschließlich den in der Packung liegenden Messlöffel benutzen.



Flasche schließen und schütteln, bis das Pulver im Wasser vollständig aufgelöst ist.

Temperatur (37 °C) an der Innenseite des Handgelenks überprüfen. Sofort die Flasche geben und innerhalb einer Stunde füttern. Nahrungsreste nicht aufwärmen oder wieder verwenden.