URGO APHTHEN MUNDSPÜLUNG

12+

Indikationen: für Aphthen, aphthöse Stomatitis.

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren.

- Sofortige Wirkung.
- Lindert Schmerzen.
- Erleichtert die Heilung von Mundgeschwüren und verkürzt deren Dauer.
- Enthält keinen Alkohol (brennt nicht).
- Enthält keine Parabene - Keinen Zucker.

Dank seiner speziellen Zusammensetzung mit Hyaluronsäure und Aloe vera verfügt die URGO Aphthen-Mundspülung über eine effektive Barrierewirkung, die eine schnelle Reduzierung der lokalen Schmerzen ermöglicht und die Heilung von Mundgeschwüren fördert.
Der Minzgeschmack sorgt für ein angenehmes Anwendungserlebnis.

Zusammensetzung:
Wasser, Xylitol, Glycerin, Damaszener-Rosenblüten-Extrakt, Polysorbat 20, Minzaroma, Natriumbenzoat (0,3%), Kaliumsorbat (0,2%), Xanthan, Polycarbophil (0,075%), Stevia, Milchsäure, Panthenol, Hyaluronsäure-Natriumsalz (0,025%), Farbstoff, Aloe-barbadensis-Blattextrakt (0,01%).

Anwendung und Dosierung:
Spülen Sie mit 10 mL des Produkts (ein Messbecher) 2-mal täglich, oder mehrmals nach Bedarf, nach den Mahlzeiten, eine Woche lang oder bis die Symptome verschwinden.
Das Produkt ist anwendungsbereit. Nicht verdünnen. Nach jeder Anwendung den Deckel aufsetzen. Spülen Sie den Messbecher nach jedem Gebrauch aus. Es wird empfohlen, nach der Anwendung mindestens 30 Minuten lang nicht zu essen und zu trinken, um die Anhaftung des Produkts zu erleichtern.
Die Verwendung des Produkts unter 12 Jahren wird nicht empfohlen.

Lagerung und Haltbarkeit:
unter 25°C lagern. Das aufgedruckte Verfallsdatum bezieht sich auf das intakte und ordnungsgemäß gelagerte Produkt. Reste oder das abgelaufene Produkt können über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Nach dem ersten Öffnen innerhalb von 14 Tagen aufbrauchen.

Nebenwirkungen:
basierend auf der wissenschaftlichen Literatur gibt es keine bekannten oder vorhersehbaren Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts. Bei unerwünschten Wirkungen während der Anwendung einen Arzt aufsuchen.

Warnhinweise:
Das Produkt muss in der Mundhöhle verwendet werden. Nicht verschlucken. Nicht bei individueller Überempfindlichkeit gegen einen oder mehrere der Inhaltsstoffe verwenden. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen. Es wird empfohlen, das Produkt im Abstand von mindestens 2 Stunden zu Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln zu verwenden. Nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt verwenden. Wenn sich die Symptome nicht verbessern, einen Arzt aufsuchen. Nach jeder Anwendung den Deckel aufsetzen. Spülen Sie den Messbecher nach jedem Gebrauch aus. Das aufgedruckte Verfallsdatum gilt für ein intaktes Produkt, das korrekt gelagert wird. Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt oder nicht intakt ist. Nicht nach dem auf der Verpackung aufgedruckten Verfallsdatum verwenden. Verwenden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen. Ordnungsgemäß entsorgen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Jeder schwerwiegende Vorfall sollte dem Hersteller und der zuständigen lokalen Behörde gemeldet werden, die weitere Ratschläge geben wird.

Zuletzt aktualisiert: V1 - 10-2022

MD Medizinprodukt

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung für wichtige Sicherheitshinweise wie Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

Gebrauchsanweisung beachten

Nach Gebrauch nicht verteilen

25°C Unter 25°C lagern

UDI UDI-Symbol

REF Artikelnummer

LOT Chargennummer

Verfallsdatum

Hersteller

Händler

CE 0476

Farmaceutici Procemsa S.p.A. SB - Via Mentana 10 - 10042 Nichelino (TO) - Italy
Protina Pharmazeutische GmbH - Adalperostraße 37 - 85737 Ismaning - Deutschland - info@protina.de