URGO APHTHEN SPRAY

12+

Indikationen: für Aphthen, Mundgeschwüre, aphthöse Stomatitis.

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren.

- Schnelle Schmerzlinderung.
- Schafft eine Barrierewirkung über der Mundschleimhaut.
- Erleichtert die Heilung von Mundgeschwüren und verkürzt deren Dauer.
- Dank des Sprühformats werden alle Mundbereiche, auch die ungünstigsten, erreicht.
- Enthält keinen Alkohol (brennt nicht).
- Enthält keine Parabene - Ohne Zucker.

Dank seiner speziellen Zusammensetzung mit Hyaluronsäure und Aloe vera verfügt das URGO APHTHEN-SPRAY über eine effektive Barrierewirkung, die eine schnelle Reduzierung der lokalen Schmerzen ermöglicht und die Heilung von Mundgeschwüren fördert. Der Minzgeschmack sorgt für ein angenehmes Anwendungserlebnis.

Zusammensetzung:
Wasser, Xylitol, Glycerin, Damaszener-Rosenblüten-Extrakt, Polysorbat 20, Minzaroma, Natriumbenzoat (0,3 %), Kaliumsorbat (0,2 %), Stevia, Xanthan, Polycarbophil (0,075 %), Milchsäure, Panthenol, Hyaluronsäure-Natriumsalz (0,03 %), Aloe-barbadensis-Blattextrakt (0,025 %).


Anwendung und Dosierung:
platzieren Sie den Dispenser auf dem betroffenen Bereich und tragen Sie das Produkt 2-mal täglich oder mehrmals nach Bedarf zwischen den Mahlzeiten eine Woche lang auf oder bis die Symptome verschwinden. Es wird empfohlen, nach der Anwendung mindestens 30 Minuten lang nicht zu essen und zu trinken, um die Anhaftung des Produkts zu erleichtern. Die Verwendung des Produkts unter 12 Jahren wird nicht empfohlen.

Lagerung und Haltbarkeit:
unter 25 °C lagern. Das aufgedruckte Verfallsdatum bezieht sich auf das intakte und ordnungsgemäß gelagerte Produkt. Reste oder das abgelaufene Produkt können über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Nach dem ersten Öffnen innerhalb von 14 Tagen aufbrauchen.

Nebenwirkungen:
basierend auf der wissenschaftlichen Literatur gibt es keine bekannten oder vorhersehbaren Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts. Bei unerwünschten Wirkungen während der Anwendung einen Arzt aufsuchen.

Warnhinweise:
das Produkt muss in der Mundhöhle verwendet werden. Nicht bei individueller Überempfindlichkeit gegen einen oder mehrere der Inhaltsstoffe verwenden. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen. Es wird empfohlen, das Produkt im Abstand von mindestens 2 Stunden zu Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln zu verwenden. Nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt verwenden. Wenn sich die Symptome nicht verbessern, einen Arzt aufsuchen. Nach jeder Anwendung den Deckel aufsetzen. Das aufgedruckte Verfallsdatum gilt für ein intaktes Produkt, das korrekt gelagert wird. Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt oder nicht intakt ist. Nicht nach dem auf der Verpackung aufgedruckten Verfallsdatum verwenden. Verwenden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen. Ordnungsgemäß entsorgen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kontakt mit den Augen vermeiden. Jeder schwerwiegende Vorfall sollte dem Hersteller und der zuständigen lokalen Behörde gemeldet werden, die weitere Ratschläge geben wird.

Zuletzt aktualisiert: V1 - 10-2022



CE 0476

Farmaceutici Procemsa S.p.A. SB - Via Mentana 10 - 10042 Nichelino (TO) - Italy
Protina Pharmazeutische GmbH - Adalperostraße 37 - 85737 Ismaning - Deutschland - info@protina.de