

PROPOLIS URTINKTUR HANOSAN

Urtinktur zum Einnehmen

Wirkstoff:

Propolis Ø [HAB, Vorschrift 4b, mit Ethanol 62 % (m/m)]

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss PROPOLIS URTINKTUR HANOSAN jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 2 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist PROPOLIS URTINKTUR HANOSAN und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von PROPOLIS URTINKTUR HANOSAN beachten?
3. Wie ist PROPOLIS URTINKTUR HANOSAN einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist PROPOLIS URTINKTUR HANOSAN aufzubewahren?
6. Weitere Informationen.

1. WAS IST PROPOLIS URTINKTUR HANOSAN UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Homöopathisches Arzneimittel

PROPOLIS URTINKTUR HANOSAN ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen holen Sie bitte medizinischen Rat ein.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON PROPOLIS URTINKTUR HANOSAN BEACHTEN?

PROPOLIS URTINKTUR HANOSAN darf nicht eingenommen werden:

- bei Überempfindlichkeit gegen Propolis oder Perubalsam, Bienen- oder Wespengift, Blütenpollen oder einen der unter Abschnitt 6. genannten Bestandteile des Arzneimittels.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von PROPOLIS URTINKTUR HANOSAN ist erforderlich:

- bei Kindern unter 12 Jahren. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Bei Einnahme von PROPOLIS URTINKTUR HANOSAN mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind nicht bekannt.

Bei Einnahme von PROPOLIS URTINKTUR HANOSAN zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte PROPOLIS URTINKTUR HANOSAN während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von PROPOLIS URTINKTUR HANOSAN:

Dieses Arzneimittel enthält 26 mg Alkohol (Ethanol) pro 1 Tropfen.

Die Menge in einer Dosis (5 Tropfen) dieses Arzneimittels entspricht weniger als 4 ml Bier oder 2 ml Wein.

Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.



3. WIE IST PROPOLIS URTINKTUR HANOSAN EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie PROPOLIS URTINKTUR HANOSAN immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren nehmen die folgenden Einzeldosen ein:

Bei **akuten Zuständen** alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 x täglich, je 5 Tropfen, bei **chronischen Verlaufsformen** 1-3 x täglich je 5 Tropfen.

Die Tropfen unverdünnt oder ggf. verdünnt in Wasser einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem in der Homöopathie erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker erfolgen.

Hinweis:

Da es sich um ein natürliches Präparat handelt, können gelegentlich leichte Trübungen oder Ausfällungen vorkommen. Die Wirksamkeit und Verträglichkeit werden hierdurch jedoch nicht beeinträchtigt. Bitte ggf. vor Gebrauch schütteln.

Dauer der Anwendung:

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann PROPOLIS URTINKTUR HANOSAN Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Behandelten auftreten müssen.

Mögliche Nebenwirkungen:

In seltenen Fällen können bei der Einnahme von PROPOLIS URTINKTUR HANOSAN Überempfindlichkeitsreaktionen, insbesondere an Mund- bzw. Rachenschleimhaut, auftreten. In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Hinweis:

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn, Website: <http://www.bfarm.de> anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST PROPOLIS URTINKTUR HANOSAN AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett/Umkarton unter <verw. bis> angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 25 °C lagern.

Dauer der Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate.

6. WEITERE INFORMATIONEN.

Was PROPOLIS URTINKTUR HANOSAN enthält:

Der Wirkstoff ist:

10 ml enthalten:

Propolis Ø [HAB, Vorschrift 4b, mit Ethanol 62 % (m/m)] 10 ml.

1 ml entspricht 22 Tropfen.

Wie PROPOLIS URTINKTUR HANOSAN aussieht und Inhalt der Packung:

PROPOLIS URTINKTUR HANOSAN ist eine rot- bis gelbbraune Flüssigkeit.

Packungsgrößen: 20 ml und 50 ml Urtinktur.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Weber & Weber GmbH
Herrschinger Str. 33
82266 Inning/Ammersee
Telefon: 08143 927-0
Fax: 08143 927-270

www.weber-weber.de

information@weber-weber.net

Weitere Angaben:

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr. 1823.00.00

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Juni 2026.