

PRODUKTINFORMATION FÜR FACHKREISE

- + Bekämpft 99,9 % der relevanten Keime*
- + Sofortiger Wirkeintritt und langanhaltende Wirkung
- + Ohne Brennen auf der Haut
- + Gold-braune Farbe als Wirksamkeitsindikator



Bezeichnung	BETAISODONA® Lösung	
Produktlogo	BETAISODONA®	
PZN	30 ml: 01931491 100 ml: 03930490 500 ml: 04923204	1000 ml: 01970433 3 x 1000 ml: 00448947
Darreichungsform	Lösung	
Anwendungsgebiet	Zur einmaligen Anwendung: Desinfektion der intakten äußeren Haut oder Antiseptikum der Schleimhaut wie z. B. vor Operationen, Biopsien, Injektionen, Punktionen, Blutentnahmen und Blasen-katheterisierungen. Zur wiederholten, zeitlich begrenzten Anwendung: Antiseptische Wundbehandlung (z. B. Dekubitus, Ulcus cruris), Verbrennungen, infizierte und superinfizierte Dermatosen. Chirurgische Händedesinfektion.	
Rechtlicher Status	Apothekenpflichtiges Arzneimittel	
Positionierung	Keimtötendes Mittel (Antiseptikum) zur Anwendung auf Haut, Schleimhaut und Wunden	
Produktinformation	BETAISODONA® – der Wunden-Profi. Ob in der Küche, im Garten oder auf dem Fahrrad: Kleine Wunden im Alltag sind schnell passiert und sind kaum zu vermeiden. Manchmal gelangen Keime in die Wunde, die die Heilung verzögern können. Um eine mögliche Wundinfektion zu bekämpfen ist es unverzichtbar, die Wunden schnell und zuverlässig zu versorgen. Für eine optimale Erstversorgung sollte die Wunde mit lauwarmem Wasser gereinigt und anschließend mit einem Antiseptikum desinfiziert werden. BETAISODONA® mit dem Wirkstoff Povidon-Iod ist der Profi für die Erstversorgung von oberflächlichen, verschmutzten Wunden wie Schürf-, Riss-, Platz- und Kratzwunden.	

	Iod wird bereits seit dem frühen 19. Jahrhundert als Antiseptikum zur Wunddesinfektion eingesetzt. Es wirkt gegen Bakterien, Pilze, Sporen, Viren und bestimmte Einzeller (Protozoen), weshalb man von einem breiten Wirkungsspektrum spricht. Außerdem zeichnet sich das Produkt durch einen sofortigen Wirkeintritt aus. In der Regel herrscht in Wunden ein saures Umfeld, in genau diesem wirkt der Povidon-Iod Komplex. Der Wirkstoff stellt gewissermaßen ein Iod-Depot dar, welches verzögert Iod freigibt und so eine langanhaltende Wirkung gewährleistet. Im Vergleich zu alkoholischen Iod-Lösungen ist Povidon-Iod verträglicher und brennt nicht, da das Iod durch die Bindung an Povidon seine hautreizenden Eigenschaften weitgehend verliert. Dies ermöglicht eine angenehme Anwendung von BETAISODONA® ohne Brennen auf der Haut. Besonders praktisch ist außerdem die natürliche gold-braune Farbe von Iod, welche die Wirksamkeit anzeigt. Verliert die Farbe an Intensität, bedeutet dies eine Erschöpfung der Wirksamkeit und es kann bei Bedarf neu aufgetragen werden.	
Produktinformation kurz	BETAISODONA® – der Wunden-Profi. • Bekämpft 99,9 % der relevanten Keime* • Sofortiger Wirkeintritt und langanhaltende Wirkung • Ohne Brennen auf der Haut • Gold-braune Farbe als Wirksamkeitsindikator	
Packungsgrößen	30 ml 100 ml 500 ml	1000 ml 3 x 1000 ml
Zusammensetzung	1 ml BETAISODONA® Lösung enthält 100 mg Povidon-Iod mit einem Gehalt von 11 % verfügbarem Iod, mittleres Molekulargewicht von Povidon etwa 40.000. <i>Sonstige Bestandteile:</i> Glycerol, Nonoxinol 9, Dinatriumhydrogenphosphat, wasserfreie Citronensäure (Ph.Eur.), Natriumhydroxid, Kaliumiodat, gereinigtes Wasser.	
Stand der Informationen	Februar 2021	

BETAISODONA® FÜR WEITERMACHER



* Humanpathogene Erreger (u.a. Staphylococcus aureus, MRSA, Streptococcus pyogenes, Candida albicans).

Betaisodona® Lösung 100 mg/g. Wirkstoff: Povidon-Iod (PVP-Iod). Apothekenpflichtig. **Zusammensetzung:** 1 ml Betaisodona® Lösung enthält 100 mg Povidon-Iod mit einem Gehalt von 11 % verfügbarem Iod, mittleres Molekulargewicht von Povidon etwa 40.000. *Sonstige Bestandteile:* Glycerol, Nonoxinol 9, Dinatriumhydrogenphosphat, wasserfreie Citronensäure (Ph.Eur.), Natriumhydroxid, Kaliumiodat, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Zur einmaligen Desinfektion der intakten äußeren Haut oder Antiseptikum der Schleimhaut wie z.B. vor Operationen, Biopsien, Injektionen, Punktionen, Blutentnahmen und Blasenkatheterisierungen. Zur wiederholten, zeitlich begrenzten antiseptischen Wundbehandlung z. B. Dekubitus, Ulcus cruris, Verbrennungen, infizierte und superinfizierte Dermatosen. Zur chirurgischen Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei Neugeborenen mit einem Geburtsgewicht unter 1.500 g, Hyperthyreose, manifesten Schilddrüsenerkrankungen, Dermatitis herpetiformis Duhring, vor und nach einer Radio-Iod-Therapie (bis zum Abschluss der Behandlung), Überempfindlichkeit gegen Iod oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels. **Nebenwirkungen:** Überempfindlichkeitsreaktionen, anaphylaktische Reaktionen, Kontaktdermatitis, Angioödem, Pneumonitis nach Aspiration; nach nennenswerter Iod-Aufnahme: Iod-induzierte Hyperthyreose (bei prädisp. Pat.), Hypothyreose, Elektrolyt-Ungleichgewicht, metabolische Azidose, akute Nieren-Insuffizienz, ungewöhnliche Blut-Osmolarität; nach Flüssigkeitsansammlung unter dem Pat. bei präop. Hautdesinfektion: chemische Verbrennung der Haut. **Warnhinweise:** Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Packungsbeilage beachten. **Mundipharma GmbH, 60549 Frankfurt am Main 07-20**